-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --

Curso: Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

3 CARGO 3: ANALISTA DE GESTÃO: MÉDICO DO TRABALHO

A respeito da atenção primária à saúde no âmbito do SUS, julgue o próximo item.

1 CORRETO | A estratégia saúde da família é considerada prioritária para a expansão e a consolidação da atenção primária à saúde no âmbito do SUS.

A respeito da atenção primária à saúde no âmbito do SUS, julgue o próximo item.

2 CORRETO | A territorialização permite à equipe de atenção primária conhecer as características demográficas, epidemiológicas, sociais e ambientais da população sob sua responsabilidade.

Acerca de políticas públicas em saúde, julgue o seguinte item.

3 ERRADO | _As políticas públicas de saúde são formuladas exclusivamente pelo Ministério da Saúde, cabendo aos estados e municípios a execução das decisões definidas pela União.

Acerca de políticas públicas em saúde, julgue o seguinte item.

4 CORRETO | A implementação de uma política pública de saúde pode produzir resultados diferentes daqueles inicialmente previstos, em razão das condições institucionais, econômicas, sociais e territoriais existentes.

Julgue o item a seguir, relativo à educação permanente em saúde.

5 CORRETO | A educação permanente em saúde parte dos problemas identificados no cotidiano do trabalho e busca produzir mudanças nas práticas profissionais e na organização dos serviços.

Julgue o seguinte item, a respeito do monitoramento na gestão clínica.

6 ERRADO | O monitoramento deve ser realizado somente ao final de cada ciclo de planejamento, pois a análise durante a execução das ações pode prejudicar a autonomia das equipes.

No que se refere à epidemiologia, julgue o item a seguir.

7 ERRADO | Quanto maior for a prevalência de uma doença em determinada população em um período específico, maior será, necessariamente, sua incidência no mesmo período.

Em relação à vigilância epidemiológica, julgue o seguinte item.

8 CORRETO | A vigilância epidemiológica envolve a coleta, a análise e a interpretação de informações sobre eventos relacionados à saúde, com a finalidade de subsidiar medidas de prevenção e controle.

Considerando indicadores básicos de saúde, julgue o seguinte item.

9 CORRETO | A proporção de óbitos entre os casos de uma doença é representada pelo coeficiente de letalidade, que funciona como indicativo da gravidade da doença ou do agravo na população.

Com base em norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, julgue o item a seguir.

10 ERRADO | A NR-6 determina que o trabalhador adquira o EPI que considerar mais adequado para sua atividade, cabendo ao contratante ressarci-lo posteriormente da despesa realizada.

Com base em norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, julgue o item a seguir.

11 CORRETO | De acordo com a NR-5, compete à CIPA registrar a percepção dos riscos dos trabalhadores por meio do mapa de risco ou de outra técnica ou ferramenta apropriada, sem ordem de preferência.

Com base em norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, julgue o item a seguir.

12 ERRADO | Segundo a NR-1, é direito do trabalhador recusar-se, mesmo sem justificativa, a submeter-se aos exames médicos previstos nas normas regulamentadoras.

No que diz respeito ao programa de controle médico de saúde ocupacional (PCMSO), julgue o próximo item.

13 ERRADO | O exame médico admissional deve ser realizado, preferencialmente, após o início das atividades do trabalhador, permitindo ao médico avaliar as condições de saúde do empregado já inserido no ambiente de trabalho.

No que diz respeito ao programa de controle médico de saúde ocupacional (PCMSO), julgue o próximo item.

14 CORRETO | O PCMSO deve incluir a realização obrigatória dos exames médicos admissional e demissional, periódico, de retorno ao trabalho e de mudança de riscos ocupacionais como parte do acompanhamento da saúde ocupacional dos empregados.

No que diz respeito ao programa de controle médico de saúde ocupacional (PCMSO), julgue o próximo item.

15 ERRADO | O prontuário médico do trabalhador deve ser eliminado logo após seu desligamento, pois as informações de saúde ocupacional deixam de ter finalidade após o término do contrato de trabalho.

Em um posto de saúde de uma aldeia indígena em uma região remota do país, uma técnica de enfermagem, de 26 anos de idade, sofreu um acidente de trabalho com objeto perfurocortante, ao realizar limpeza de material cirúrgico que continha restos biológicos.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

16 ERRADO | Caso o objeto perfurocortante tenha sido utilizado em parto de gestante não identificada e contivesse apenas restos de líquido amniótico, não há indicação para uso da profilaxia pós-exposição (PEP) pela técnica de enfermagem.

Em um posto de saúde de uma aldeia indígena em uma região remota do país, uma técnica de enfermagem, de 26 anos de idade, sofreu um acidente de trabalho com objeto perfurocortante, ao realizar limpeza de material cirúrgico que continha restos biológicos.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

17 CORRETO | Caso o objeto perfurocortante contivesse sangue, o acesso da técnica de enfermagem à profilaxia pós-exposição (PEP) deveria ocorrer em até 72 horas do acidente, pois, após esse período, a PEP deixaria de ser indicada, sendo necessário, contudo, o acompanhamento sorológico.

Em um posto de saúde de uma aldeia indígena em uma região remota do país, uma técnica de enfermagem, de 26 anos de idade, sofreu um acidente de trabalho com objeto perfurocortante, ao realizar limpeza de material cirúrgico que continha restos biológicos.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

18 ERRADO | Havendo indicação da profilaxia pós-exposição (PEP), o esquema deverá ter duração de duas semanas, com dois antirretrovirais, se o teste de gravidez da técnica de enfermagem for positivo, ou com três antirretrovirais, se negativo o teste de gravidez.

Em um posto de saúde de uma aldeia indígena em uma região remota do país, uma técnica de enfermagem, de 26 anos de idade, sofreu um acidente de trabalho com objeto perfurocortante, ao realizar limpeza de material cirúrgico que continha restos biológicos.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

19 ERRADO | Após avaliação médica, caso a profilaxia pós-exposição (PEP) não seja necessária e a capacidade laborativa da técnica de enfermagem não tenha sido afetada, será prescindível a emissão de comunicação de acidente de trabalho (CAT).

Em um posto de saúde de uma aldeia indígena em uma região remota do país, uma técnica de enfermagem, de 26 anos de idade, sofreu um acidente de trabalho com objeto perfurocortante, ao realizar limpeza de material cirúrgico que continha restos biológicos.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

20 CORRETO | A ocorrência do referido acidente de trabalho enseja a revisão da avaliação de riscos, conforme prevê a NR-1.