

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --**Questão 31**

O art. 24 da Lei n.º 8.080/1990 estabelece a possibilidade de o Sistema Único de Saúde (SUS) recorrer a serviços da iniciativa privada para garantir cobertura assistencial à população. Porém, entidades privadas não concorrem em igualdade de condições, pois a preferência é concedida a

- A autarquias e fundações.
- B empresas que tenham convênio com o SUS.
- C entidades filantrópicas.
- D sociedades de economia mista.

Questão 32

Com base nas leis vigentes que regem o SUS, a política de recursos humanos na área da saúde deve incluir a

- A subordinação ao SUS de escolas públicas que formam trabalhadores de saúde.
- B instituição de planos de cargos e carreira.
- C valorização da dedicação exclusiva a serviços do SUS.
- D fixação de pisos salariais nacionais para cada categoria profissional.

Questão 33

Segundo a legislação em vigor, entre os princípios de ações e serviços das entidades que integram o SUS, está a

- A adoção da epidemiologia como orientadora do desenvolvimento de programas no âmbito do SUS.
- B manutenção de estruturas de serviços públicos em duplicidade, visando garantir a universalidade de acesso.
- C ênfase na descentralização dos serviços de saúde da União para estados e Distrito Federal.
- D publicidade de informações sobre a utilização do SUS e o estado de saúde das pessoas assistidas.

Questão 34

De acordo com a legislação vigente a respeito do financiamento do SUS, assinale a opção correta.

- A Bens apreendidos e leiloados em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes têm seus valores diretamente creditados ao SUS, para ações de recuperação de viciados.
- B Ações de promoção nutricional do SUS são financiadas com recursos do orçamento fiscal.
- C Bens apreendidos e leiloados pela Receita Federal têm seus valores creditados ao Fundo Nacional de Saúde.
- D Ações de saneamento eventualmente executadas pelo SUS são financiadas por recursos tarifários e pelo Sistema Financeiro da Habitação.

Questão 35

Determinada investigação sobre a incidência de câncer de bexiga foi realizada em dois grupos (intervenção e controle). O grupo de intervenção teve, em sua composição, sujeitos fumantes, e o grupo de controle, sujeitos não fumantes. Os dois grupos foram acompanhados no tempo para verificar quais integrantes desenvolveram ou não a referida doença e se essa exposição prévia estaria relacionada à ocorrência da doença.

Considerando essa situação hipotética, assinale a opção que apresenta o tipo de estudo correspondente ao delineamento experimental da investigação em tela.

- A série de casos
- B estudo seccional
- C estudo caso-controle
- D estudo de coorte

Questão 36

Uma criança de cinco anos de idade foi levada pelos pais à unidade de saúde para imunização e acompanhamento de seu crescimento e desenvolvimento. A mãe informou que a criança estava “enjoadinha” e com febre baixa havia dois dias. Ao exame físico, foram constatados crescimento e desenvolvimento normais para a idade da paciente e temperatura corporal de 37,6 °C.

A partir dessa situação hipotética, assinale a opção que indica a contraindicação para a vacinação dessa criança.

- A Temperatura corporal aferida e histórico de febre.
- B Reação anterior à vacinação, que consistiu em presença de sibilos e hipotensão.
- C Amidalite aguda leve em uso de antibiótico.
- D Reação prévia à vacinação, que consistiu em febre, eritema no local da aplicação e irritação leve por dois dias.

Questão 37

No que diz respeito aos aspectos de vigilância epidemiológica e à doença causada pelo novo coronavírus (covid-19), assinale a opção correta.

- A No início do ano de 2020, após confirmação da transmissão comunitária do novo coronavírus no Brasil, foram criados o Sistema de Vigilância de Síndromes Respiratórias e uma rede de Vigilância Sentinela de Síndrome Gripal (SG), a fim de realizar o controle dessa importante infecção respiratória aguda, causada pelo SARS-CoV-2.
- B O teste sorológico ELISA, que indica a presença de IgA, é suficiente para estabelecer infecção por SARS-CoV-2.
- C Na cidade de Wuhan, a partir de amostras de lavado broncoalveolar coletadas em um grupo de pacientes com pneumonia de causa desconhecida, identificou-se o SARS-CoV-2, que é um betacoronavírus pertencente ao subgênero *Sarbecovirus*, da família *Coronaviridae*, configurando-se como o sétimo coronavírus a infectar seres humanos.
- D A transmissibilidade do SARS-CoV-2 ocorre facilmente entre profissionais de saúde expostos a procedimentos médicos que gerem aerossóis, independentemente de eles estarem usando máscaras do tipo N95 ou PFF2.

Questão 38

Em relação às medidas de prevenção de infecção em cateter central de inserção periférica (PICC), assinale a opção correta.

- A Após a cicatrização do óstio, que dura em média duas semanas, deve-se manter o sítio de inserção descoberto.
- B A degermação e a antisepsia com gluconato de clorexidina devem ser feitas rotineiramente para a manutenção do cateter, o qual deverá ser substituído após cinco dias de uso.
- C Devido ao risco elevado de infecção, o PICC não deve ser utilizado em pacientes neonatais e pediátricos.
- D Para a inserção, é necessária a adoção de precauções de barreira máxima, que incluem uso de gorro, máscara, luvas estéreis, avental estéril e campo ampliado estéril.

Questão 39

No cuidado com recém-nascidos em fototerapia, deve-se

- A utilizar fototerapia reversa com seis a oito tubos paralelos fluorescentes abaixo do recém-nascido, para menores de 1.500 g.
- B realizar proteção ocular utilizando gaze e fita adesiva.
- C manter equipamentos e extensores de soluções lipídicas desprotegidos para melhor exposição à luz e diminuição da viscosidade infundida.
- D aumentar a oferta hídrica em decorrência da elevação de perdas insensíveis, ao se utilizar lâmpada fluorescente.

Questão 40

Um paciente adulto chegou não responsivo e com respiração anormal para atendimento no setor de emergência de um hospital. Seu pulso não foi detectado e as manobras de ressuscitação cardiopulmonares foram iniciadas, instalando-se rapidamente o monitor com desfibrilador.

Com relação a essa situação hipotética, assinale a opção correta.

- Ⓐ No caso de fibrilação ventricular, aplica-se o choque mantendo manobras de ressuscitação por mais dois minutos. Se esse mesmo ritmo permanecer, novo choque deverá ser aplicado.
- Ⓑ Se for constada assistolia, deve-se aplicar o choque mantendo manobras por mais de cinco minutos, revertendo para fibrilação atrial, utilizando-se atropina venosa.
- Ⓒ Se for constatado ritmo sinusal, deve-se aplicar lidocaína na dose de 1 mg/kg e manter manobra na taxa de 30:2 (compressão/ventilação).
- Ⓓ No caso de ausência de atividade elétrica, deve-se aplicar o choque com carga inicial de 100 J. Se o ritmo permanecer, é recomendado administrar amiodarona.

Questão 41

Com relação à assistência à gestante e à puérpera com covid-19, assinale a opção correta.

- Ⓐ Gestantes com quadro moderado de covid-19, que não apresentem sangramentos ou diminuição na contagem de plaquetas, podem receber anticoagulação profilática, com heparina não fracionada ou heparina de baixo peso molecular.
- Ⓑ É contraindicada a posição prona em gestantes com covid-19, pois há comprovação de dificuldade ventilatória materna e de riscos ao feto.
- Ⓒ A amamentação deve ser suspensa quando a mulher for diagnosticada com covid-19.
- Ⓓ Em caso de diagnóstico confirmado de covid-19, deve-se realizar cesariana, sendo contraindicado o parto normal.

Caso clínico 1A2

Um homem de 62 anos de idade está sendo acompanhado no ambulatório de estomatoterapia para tratamento de lesão em membro inferior esquerdo (MIE). O paciente é fumante de longa data, hipertenso e tem dislipidemia. Ele informou ter hábito de sono regular, sem queixas, possuir doença arterial obstrutiva periférica diagnosticada há um ano e lesão no MIE há um ano e dois meses. O paciente apresenta quadro de dor na lesão, classificada como 7 pontos na escala até 10. Ele informou que a dor está presente desde o início da doença, mas que se agravou na última semana. O paciente possui, ainda, lesão arterial em MIE, que se localiza na região pré-tibial, circular, com área atual de 2,0 cm², profunda parcial (até subcutâneo), hipocorada, não infectada, com tecido necrótico seco estável aderido em toda extensão, ausência de pelos na região perilesional, sem exudato, sem odor desagradável, pododáctilo esquerdo cianótico, e pulsos femoral, poplíteo e tibial ausentes (apenas em MIE). Apresenta marcha claudicante, índice de pressão tornozelo-braço (ITB) de 0,45 à esquerda e de 1,0 à direita. Seu número de hemácias está diminuído. O paciente exibe expressão facial de dor no momento do curativo.

Questão 42

Considerando o caso clínico 1A2, o planejamento da assistência no caso apresentado e os sistemas de classificação — classificação de diagnósticos (NANDA-I), de intervenções (NIC) e de resultados (NOC) —, assinale a opção correta.

- Ⓐ O diagnóstico de dor aguda está presente, sendo evidenciada pelo agente lesivo, relacionada ao autorrelato da intensidade usando escala padronizada de dor e expressão facial de dor.
- Ⓑ Deve-se formular o diagnóstico de integridade tissular prejudicada, devido à circulação prejudicada, caracterizada pelo dano tecidual.
- Ⓒ Deve-se intervir com ações na assistência para o ganho de peso, conforme a NIC, pois o diagnóstico de nutrição desequilibrada menor do que as necessidades corporais deve ser elaborado.
- Ⓓ Considerando a NOC, são resultados a serem traçados: controle dos aspectos ambientais, auxílio na locomoção (uso de dispositivos auxiliares) e controle da dor com administração de analgésicos.

Questão 43

Ainda com relação ao caso clínico 1A2, para o cuidado da lesão arterial, recomenda-se

- Ⓐ uso da Bota de Unna.
- Ⓑ limpeza com solução fisiológica 0,9%, mantendo a ferida protegida, o membro aquecido e, até a determinação completa do estado de perfusão, não fazer desbridamento cirúrgico.
- Ⓒ uso de cobertura primária à base de alginato de cálcio, cobertura secundária com gazes e compressão com meia elástica.
- Ⓓ limpeza com líquido de Dakin, seguida de cobertura com sulfadiazina de prata e carvão ativado.

Espaço livre

Questão 44

No período pós-operatório, o paciente está suscetível a complicações de várias ordens e, em especial, à trombose venosa profunda (TVP). Assinale a opção que apresenta o tratamento profilático instituído para paciente pós-operatório de cirurgia abdominal com múltiplos fatores de risco.

- A** Compressão pneumática externa intermitente e meias elásticas em combinação com heparina de baixo peso molecular, como a enoxaparina.
- B** Elevação dos membros inferiores e agentes fibrinolíticos, a exemplo da varfarina injetável.
- C** Uso de coxim na região poplíteia, mantendo as pernas fletidas, e uso de bolsas de calor alternadas com frio na panturrilha.
- D** Estímulo à permanência do paciente no leito e incentivo a deixar suas pernas pendentes na cama, para melhorar a circulação.

Questão 45

A respeito dos referenciais teóricos de enfermagem, assinale a opção correta.

- A** Os metaparadigmas, ou teorias do conhecimento da enfermagem, representam o empírico, o intuitivo, o estético e o moral ou ético.
- B** A teoria do portão de controle da dor foi desenvolvida por Martha Rogers.
- C** As teorias de médio alcance representam teorias específicas a uma situação e limitam a abordagem a determinadas populações ou pacientes.
- D** O modelo de Betty Neuman é conhecido como de autocuidado.

Questão 46

O sistema formado pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e pelos conselhos regionais de enfermagem (COREN) é

- A** uma organização da sociedade civil de interesse público.
- B** uma fundação.
- C** uma autarquia.
- D** um conjunto de associações sem fins econômicos.

Questão 47

De acordo com a legislação vigente, o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe

- A** deve manter o número de conselheiros que o Conselho Federal de Enfermagem fixar.
- B** precisa repassar um quinto do valor arrecadado com anuidades ao Conselho Federal de Enfermagem.
- C** pode transferir sua sede para o município de São Cristóvão, limítrofe a Aracaju.
- D** pode ter um membro de nacionalidade estrangeira, desde que haja alteração em seu regimento interno.

Questão 48

Com base na legislação nacional que regulamenta o exercício da enfermagem, é correto afirmar que

- A** entidades de direito privado que mantenham atividades de formação de recursos humanos em enfermagem devem se registrar no Conselho Regional de Enfermagem local.
- B** enfermeiros podem participar de projetos de construção de unidades de internação.
- C** apenas enfermeiros podem coordenar cursos para formação de recursos humanos em enfermagem.
- D** titulares de diplomas estrangeiros em enfermagem, ainda que revalidados no Brasil, não podem ser considerados enfermeiros.

Questão 49

De acordo com os dispositivos que regulam direitos e obrigações de profissionais de enfermagem, é correto afirmar que é

- A** dever profissional participar em movimentos reivindicatórios da categoria.
- B** permitido delegar a acompanhantes dos pacientes atribuições de profissionais de enfermagem em alguns casos de atenção domiciliar.
- C** facultado ao profissional comunicar externamente caso de violência contra idoso.
- D** obrigatório ao profissional identificar as instituições envolvidas quando publicar resultados de suas pesquisas.

Questão 50

Considere que uma enfermeira fiscal do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe tenha observado cada uma das quatro situações mencionadas nas opções a seguir. Assinale a opção que corresponde à situação que representa infração aos parâmetros mínimos de quantitativo de profissionais das diferentes categorias de enfermagem para serviços de enfermagem, o que requer a ação da enfermeira fiscal.

- A** Unidade de cuidados intermediários com um terço dos profissionais de enfermagem sendo enfermeiros.
- B** Unidade de hemodiálise convencional com um profissional de enfermagem para cada três pacientes.
- C** UTI psiquiátrica com o mesmo cálculo e quantitativo de profissionais de enfermagem exigido em uma UTI convencional.
- D** Centro de diagnóstico por imagem, com setor de mamografias e raios X convencionais sem enfermeiros dedicados, havendo apenas convocação do enfermeiro do centro em momentos de urgência, de emergência e de supervisão dos técnicos de enfermagem.

Espaço livre