

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (PCDF)

CARGO 13: GESTOR DE APOIO ÀS ATIVIDADES POLICIAIS CIVIS ESPECIALIDADE: ODONTÓLOGO

Prova Discursiva

Aplicação: 12/01/2025

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

1 Abordagem inicial de ordem geral da circunstância do trauma, com o devido prognóstico do dente 11 em relação ao tempo de início do atendimento odontológico e tipo de armazenagem, conforme o consenso científico, além de considerações clínicas sobre a possibilidade de não encontrar o dente 21

A abordagem envolve o seguinte desenvolvimento:

- (i) devem ser analisadas as circunstâncias de quando, onde e como o trauma aconteceu, mencionando verificação do estado geral/nível de consciência (estado neurológico ou traumatismos em outras regiões do corpo) e se há necessidade de encaminhamento médico imediato;
- (ii) em relação ao prognóstico do dente 11, o tempo é o fator primordial para ditar o prognóstico do caso de avulsão dentária, quanto menor o tempo extraoral, melhor será seu prognóstico; a literatura preconiza um limite de tempo por 30 min. a 60 min., no máximo, fora da cavidade oral (menos de 20 min. é considerado tempo de excelente prognóstico; ultrapassados 60 min., diminui-se o percentual de sucesso devido à rápida necrose celular do ligamento periodontal aderidas ao dente;
- (iii) em relação à armazenagem do dente, o ideal é que ele estivesse hidratado durante o período extra oral, sendo a solução balanceada de Hanks considerada o melhor meio de conservação, seguida do leite, no próprio vestíbulo bucal em contato com a saliva ou solução salina;
- (iv) caso o dente 21 tenha, de fato, sido avulsionado e não encontrado, após as medidas iniciais de urgência, a criança deverá ser sequencialmente encaminhada para avaliação médica, para certificar que não ocorreu deglutição ou aspiração do elemento dental, o que poderia gerar complicações.

2 Diagnóstico e desenvolvimento clínico em relação ao tratamento de urgência do dente 11

O diagnóstico é de (i) avulsão dental, devendo-se imediatamente (ii) hidratar/lavar delicadamente o dente com solução balanceada de Hanks ou solução salina, (iii) irrigar o alvéolo e o implante, (iv) com splintagem semirrígida, (v) com fio de aço ou resina, (vi) por período de 3-4 semanas.

3 Diagnóstico e desenvolvimento clínico em relação ao tratamento de urgência do dente 12

O diagnóstico é de (i) fratura de coroa. (ii) Avaliar se a fratura é apenas em esmalte, dentina (fraturas incompletas ou fraturas não complicadas) ou polpa (fraturas complicadas). No caso das fraturas (iii) não complicadas, poderá ser realizada a colagem do fragmento da coroa encontrado. No caso de (iv) fraturas complicadas, que envolvem a polpa, todo o esforço deve ser realizado para manter o dente vital pelo menos até que o ápice e a raiz cervical tenham se desenvolvido completamente. Deve-se avaliar a extensão da lesão, podendo-se realizar o (v) capeamento pulpar, a (vi) pulpotomia total ou a (vii) pulpotomia parcial.

4 Prescrições e orientações após procedimento de urgência

Deve-se proceder à orientação a (i) confirmar período vacinal expirado – antitetânica, e à prescrição de (ii) antibióticos: penicilina, (iii) anti-inflamatório não esteroide e (iv) analgésico.

QUESITOS AVALIADOS

Quesito 2.1 – Abordagem inicial de ordem geral da circunstância do trauma, com o devido prognóstico do dente 11 em relação ao tempo de início do atendimento odontológico e tipo de armazenagem, conforme o consenso científico, além de considerações clínicas sobre a possibilidade de não encontrar o dente 21

Conceito 0 – Não abordou nenhum dos procedimentos previstos ou o fez de forma totalmente incorreta.

Conceito 1 – Abordou corretamente apenas um dos seguintes itens: (i) análise das circunstâncias (onde, quando e como e necessidade de avaliação médica imediata); (ii) tempo extraoral de até 30/60 min.; (iii) meio de armazenagem; (iv) preocupação de aspiração/deglutição.

Conceito 2 – Abordou corretamente apenas dois dos quatro itens anteriormente enumerados.

Conceito 3 – Abordou corretamente apenas três dos quatro itens anteriormente enumerados.

Conceito 4 – Abordou corretamente os quatro itens anteriormente enumerados.

Quesito 2.2 – Diagnóstico e desenvolvimento clínico em relação ao tratamento de urgência do dente 11

Conceito 0 – Não abordou o aspecto ou o fez de forma totalmente incorreta.

Conceito 1 – Mencionou corretamente apenas um dos seguintes itens: (i) diagnóstico de avulsão dental; (ii) hidratação ou lavagem delicada do dente com solução balanceada de Hanks ou salina; (iii) irrigação alveolar e reimplante; (iv) splintage semirrígida; (v) com fio de aço ou resina; (vi) por período de 3-4 semanas.

Conceito 2 – Discorreu corretamente apenas sobre dois dos itens anteriormente enumerados.

Conceito 3 – Discorreu corretamente apenas sobre três dos itens anteriormente enumerados.

Conceito 4 – Discorreu corretamente apenas sobre quatro dos itens anteriormente enumerados.

Conceito 5 – Discorreu corretamente apenas sobre cinco dos itens anteriormente enumerados.

Conceito 6 – Discorreu corretamente sobre os seis itens anteriormente enumerados.

Quesito 2.3 – Diagnóstico e desenvolvimento clínico em relação ao tratamento de urgência do dente 12

Conceito 0 – Não abordou o aspecto ou o fez de forma totalmente incorreta.

Conceito 1 – Mencionou apenas um dos seguintes itens: (i) diagnóstico de fratura de coroa; (ii) nível da fratura, se apenas em esmalte; dentina (fraturas incompletas ou fraturas não complicadas) ou polpa (fraturas complicadas); (iii) procedimento, na hipótese de fraturas não complicadas, colagem do fragmento; (iv) procedimento, na hipótese de fraturas complicadas, preservação ao máximo até apicificação; (v) extensão da lesão pulpar, fazendo capeamento ou (vi) pulpotomia parcial ou (vii) pulpotomia total.

Conceito 2 – Discorreu corretamente apenas sobre dois dos itens anteriormente enumerados.

Conceito 3 – Discorreu corretamente apenas sobre três dos itens anteriormente enumerados.

Conceito 4 – Discorreu corretamente apenas sobre quatro dos itens anteriormente enumerados.

Conceito 5 – Discorreu corretamente apenas sobre cinco dos itens anteriormente enumerados.

Conceito 6 – Discorreu corretamente apenas sobre seis dos itens anteriormente enumerados.

Conceito 7 – Discorreu corretamente sobre os sete itens anteriormente enumerados.

Quesito 2.4 – Prescrições e orientações após procedimento de urgência

Conceito 0 – Não abordou o aspecto ou o fez de forma totalmente incorreta.

Conceito 1 – Mencionou corretamente apenas um dos seguintes itens: (i) confirmar período vacinal de antitetânica; prescrição de (ii) antibióticos; (iii) anti-inflamatório não esteroide e (iv) analgésico.

Conceito 2 – Mencionou corretamente apenas dois dos itens anteriormente enumerados.

Conceito 3 – Mencionou corretamente apenas três dos itens anteriormente enumerados.

Conceito 4 – Mencionou corretamente os quatro itens anteriormente enumerados.