

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --**Texto 5A1-I**

Conservar a floresta de restinga na região do estuário do Rio Paraíba faz parte da missão da Floresta Nacional da Restinga de Cabedelo, localizada em um recorte do território dos municípios de Cabedelo e João Pessoa.

ICMBio. Plano de Manejo da Floresta Nacional Restinga de Cabedelo, 2016.

Questão 51

Tendo como referência o texto 5A1-I, nos terraços marinhos quaternários da área de floresta de restinga dessa região ocorrem, predominantemente,

- Ⓐ neossolos quartzarênicos cobertos com uma camada orgânica de espessura variável formada pelo acúmulo de serrapilheira.
- Ⓑ luvisolos crômicos constituídos de grande quantidade de material mineral proveniente do fluxo diário das marés.
- Ⓒ latossolos amarelos cobertos com uma camada orgânica de espessura variável formada pelo acúmulo de serrapilheira.
- Ⓓ cambissolos úmidos constituídos de uma camada orgânica de espessura variável formada pelo acúmulo de depósitos flúvio-marinhos.
- Ⓔ gleissolos sálicos constituídos de grande quantidade de material mineral proveniente do fluxo diário das marés.

Questão 52

A floresta de restinga da região mencionada no texto 5A1-I possui

- Ⓐ estratos predominante arbustivos, com espécies em torno de 5 metros de altura, como o cambará (*Moquiniastrum polymorphum*).
- Ⓑ árvores emergentes que podem atingir mais de 20 metros de altura, como o araçá (*Psidium guineense*).
- Ⓒ estratos arbustivos e arbóreos, com espécies entre 5 e 10 metros de altura, como o pinheiro-de-casquinha (*Pinophyta sylvestris*).
- Ⓓ estratos predominantes arbóreos, com espécies entre 10 e 15 metros, como o cedro (*Cedrus atlantica*).
- Ⓔ árvores emergentes que podem atingir mais de 15 metros de altura, como o jatobá (*Hymenaea courbaril*).

Questão 53

Ainda com referência ao texto 5A1-I, durante a elaboração do inventário da avifauna da Floresta Nacional da Restinga de Cabedelo, foi identificada uma espécie que normalmente ocorre na caatinga, não sendo comum na região da unidade de conservação.

Considerando a situação apresentada, assinale a opção que corresponde à espécie de ave exógena que se encaixa nesse perfil.

- Ⓐ urubu-de-cabeça-preta (*Coragyps atratus*)
- Ⓑ gralha canã (*Cyanocorax cyanopogon*)
- Ⓒ rolinha-roxa (*Columbina talpacoti*)
- Ⓓ bem-te-vi (*Pitangus sulphuratus*)
- Ⓔ anu-preto (*Crotophaga ani*)

Questão 54

A supressão da vegetação de florestas pode comprometer a qualidade do solo, tornando-o incapaz de sustentar o ecossistema nativo. Um de seus efeitos é o arraste de partículas presentes na superfície de solo pelo escoamento superficial homogeneamente distribuído da água das chuvas, o que caracteriza o processo como erosão

- Ⓐ em *splash*.
- Ⓑ por voçorocas.
- Ⓒ por intemperismo.
- Ⓓ laminar.
- Ⓔ em sulcos.

Questão 55

A instalação de um grande empreendimento imobiliário ocasionou o alagamento de área florestal de preservação permanente pela água das chuvas.

Nessa situação, entre as alterações do solo com potenciais efeitos danosos para o ecossistema, decorrentes desse cenário, inclui-se

- Ⓐ a morte da microbiota aeróbica obrigatória decorrente do aumento da agregação e compactação do solo.
- Ⓑ o crescimento da população de microrganismos aeróbicos obrigatórios, pelo aumento da quantidade de matéria orgânica disponível.
- Ⓒ a morte da microbiota aeróbica obrigatória e a transformação do nitrogênio na forma de nitrato para gás nitrogênio pela ação de outros microrganismos.
- Ⓓ a morte da microbiota aeróbica obrigatória e a diminuição do pH e o aumento do potencial redox do solo pela ação de outros microrganismos.
- Ⓔ o crescimento da população de microrganismos aeróbicos com consequente diminuição da disponibilidade de fósforo para o meio.

Questão 56

Uma área de caatinga no município de Salgadinho (PB) está sendo considerada para soltura de um lagarto da espécie *Phyllorhynchus periosus*, apreendido durante operação para apuração de crimes ambientais. Considerando a espécie em questão, a área

- Ⓐ é adequada para soltura do espécime, visto que possui um bioma apropriado.
- Ⓑ é inadequada para soltura do espécime, pois a Paraíba não possui répteis da família Leiosauridae entre suas espécies nativas.
- Ⓒ é inadequada para soltura do espécime, uma vez que a Paraíba não possui répteis da família Tropiduridae entre suas espécies nativas.
- Ⓓ é inadequada para soltura do espécime, visto que a Paraíba não possui répteis da família Teiidae entre suas espécies nativas.
- Ⓔ é inadequada para soltura do espécime, uma vez que a Paraíba não possui répteis da família Gekkonidae entre suas espécies nativas.

Questão 57

O derramamento de rejeitos químicos resultantes de atividades de mineração em florestas pode contaminar o solo, de modo a interferir nos processos bioquímicos das plantas. A mobilidade desses poluentes para reservatórios naturais de água é maior em solos

- Ⓐ com espessa cobertura vegetal.
- Ⓑ compactados.
- Ⓒ arenosos.
- Ⓓ argilosos.
- Ⓔ com alto pH.

Texto 5A1-II

A determinação do intervalo *post mortem* (IPM) por meio da utilização de entomologia forense implica em estabelecer intervalos de tempo mínimo e máximo, desde a exposição do corpo aos insetos até a sua descoberta.

Questão 58

Os intervalos de tempo mínimo e máximo, citados no texto 5A1-II, podem ser considerados coincidentes caso

- Ⓐ fatores climáticos, como frio, mantenham as larvas de insetos em estado de dormência.
- Ⓑ vertebrados predadores de insetos se alimentem dos espécimes adultos dos insetos presentes.
- Ⓒ formigas ataquem a população imatura de insetos.
- Ⓓ não haja influência de qualquer fator de retardo ao desenvolvimento da entomofauna presente.
- Ⓔ não ocorra sucessão entre os estágios de desenvolvimento dos insetos.

Questão 59

Ainda com relação ao texto 5A1-II, para determinação do IPM utilizando moscas califórneas, um método prático consiste em comparar o tamanho de espécimes coletados ao de amostras padrão — em estágios equivalentes de desenvolvimento —, criadas em laboratório a temperaturas semelhantes àquelas nas quais se deu o desenvolvimento dos espécimes coletados na cena do crime. Nesse caso, é recomendável que a temperatura de crescimento da amostra padrão seja equivalente à temperatura

- Ⓐ ambiente, para as larvas nos últimos estágios de desenvolvimento.
- Ⓑ do solo, para os ovos.
- Ⓒ da massa de larvas, para as larvas no primeiro estágio de desenvolvimento.
- Ⓓ do solo, para as pupas.
- Ⓔ da massa de larvas, para os espécimes adultos.

Questão 60

Na estimativa do IPM pela análise da sucessão de insetos em um cadáver, é muito importante determinar a ordem em que cada espécie estabelece sua colonização. Tradicionalmente, os primeiros insetos colonizadores do cadáver são espécies de

- Ⓐ sifonápteros necrófilos.
- Ⓑ himenópteros parasitas.
- Ⓒ coleópteros parasitas.
- Ⓓ lepidópteros necrófilos.
- Ⓔ dípteros necrófagos.

Questão 61

Dois bebês foram trocados na maternidade de um hospital e, somente anos depois, uma das mães, Maria, recebeu a informação de que ela não era a mãe biológica de sua filha, Joana. O exame de DNA, solicitado pelo suposto pai e ex-companheiro de Maria, apresentou o resultado que confirmou ter havido erro da unidade de saúde uma vez que tanto o suposto pai quanto Maria não possuíam perfis genéticos compatíveis com o de pais biológicos de Joana. Maria nunca desconfiou que poderia ter havido troca dos bebês no hospital, pois, segundo ela, a menina tem aparência semelhante à de sua família, pois o pai é claro, a mãe é morena e o irmão, negro.

Com relação à situação hipotética apresentada e assuntos correlatos, assinale a opção correta.

- Ⓐ O resultado do exame confirma o fato de que Maria e Joana certamente não possuem alelos em comum.
- Ⓑ A semelhança física também é utilizada para o cálculo do índice de paternidade e maternidade.
- Ⓒ O exame de paternidade comumente empregado para os casos como o descrito no texto é o exame de DNA mitocondrial.
- Ⓓ O exame de DNA realizado entre a criança e sua mãe biológica deve indicar compartilhamento de alelos em todos os marcadores genéticos analisados, salvo casos raros de mutação.
- Ⓔ Maria deve ter tido mutações na formação do óvulo e, por isso, o exame de DNA apresentou como resultado a exclusão da maternidade para sua filha de criação.

Questão 62

No processo de extração de DNA, são utilizadas diversas soluções, cada uma com sua função. Assinale a opção que apresenta a substância quelante de cátions divalentes que garante a integridade da molécula de DNA por inibir a ação de nucleases.


- Ⓐ EDTA
- Ⓑ SDS
- Ⓒ DTT
- Ⓓ proteinase K
- Ⓔ hidróxido de cálcio

Questão 63

A reação em cadeia da polimerase (PCR, do inglês *Polymerase Chain Reaction*) permite copiar regiões específicas do DNA. A técnica de PCR em tempo real é uma variação da técnica de PCR que permite estimar a quantidade de DNA em amostras biológicas por meio de sondas que emitem fluorescência. A amplificação da sequência-alvo é monitorada durante o processo e, à medida que o DNA é amplificado, o nível de fluorescência cresce proporcionalmente. O resultado é visualizado ao longo do processo, dispensando a etapa de eletroforese. Essa técnica

- Ⓐ identifica a sequência de DNA e suas respectivas mutações por meio de sequenciamento completo.
- Ⓑ estima, por meio da taxa de degradação, o intervalo pós-morte de um cadáver.
- Ⓒ identifica fontes de contaminação na amostra.
- Ⓓ permite inferir a presença de inibidores na reação de amplificação.
- Ⓔ identifica o número correto de contribuintes em amostras que contêm misturas de perfis genéticos.

Figura 5A2



Os perfis genéticos dos indivíduos I-1 e I-2 para um determinado marcador genético são 11-15 e 14-16, respectivamente.

Questão 64

Tendo a figura 5A2 como referência, os possíveis genótipos dos filhos do casal da geração I, excluindo-se eventos de mutação, são

- A 11-11, 11-12, 14-15 e 15-16.
- B 11-14, 11-16, 14-15 e 15-16.
- C 11-14, 11-16, 14-15 e 14-16.
- D 11-14, 14-15, 14-16 e 16-16.
- E 11-14, 11-15, 11-16 e 15-16.

Questão 65

Ainda com relação a figura 5A2, levando-se em consideração os perfis da geração I descritos e $f(14)$ como a frequência do alelo 14 na população, a probabilidade de um de seus netos (geração III) apresentar o alelo 14 neste mesmo marcador é de

- A $0,5 + f(14)$.
- B 0,25.
- C $f(14)$.
- D $0,25 + f(14)$.
- E 0,5.

Questão 66

Analisando-se os perfis genéticos de I-1, I-2 e II-3 em 23 marcadores genéticos, observou-se que somente no marcador descrito na figura 5A2 foi obtido um resultado incompatível. O indivíduo II-3 apresentou genótipo 15-17 para o referido marcador genético. A possível explicação para este resultado é que

- A II-3 foi adotado e, por isso, apresenta perfil não compatível com o de um filho biológico de I-1 e I-2.
- B um evento de mutação em uma etapa possa ter ocorrido na formação dos gametas de I-2.
- C houve troca de amostra no exame laboratorial.
- D II-3 deve ter sido trocado na maternidade.
- E o *kit* utilizado para análise estava vencido e, por isso, apresentou um artefato somente neste marcador em todas as replicatas da amostra.

Questão 67

Ao analisar uma amostra de local de crime, o perito identificou o seguinte perfil genético.

marcador genético	perfil obtido
TH01	9.3
D16S539	9-12-13
D8S1179	15-19
D21S11	31.2-32.2-35
D2S441	8-11.3-14-17

Diante do resultado obtido, infere-se que a amostra

- A apresenta degradação.
- B apresenta artefatos de amplificação.
- C provém de, pelo menos, cinco pessoas.
- D apresenta excesso de DNA.
- E provém de, pelo menos, duas pessoas.

Questão 68

A molécula de DNA pode sofrer efeitos do meio onde se encontra. Condições ambientais, como sol e chuva, podem afetar a amostra e, consequentemente, interferir nos resultados da análise de DNA. A partir dessas informações, assinale a opção correta, acerca de análise genética.

- A Uma forma de tentar obter perfil genético de amostras degradadas é trabalhar com sequências mais longas de DNA, uma vez que sequências maiores tendem a degradar mais lentamente.
- B O uso de banco de perfis genéticos em análise de amostras de desastres em massa é uma ferramenta muito útil ao possibilitar a busca por familiares das vítimas, permitindo uma identificação mais rápida dos corpos que não puderam ser identificados por outras técnicas.
- C Para a análise de DNA de corpos em estado de decomposição, recomenda-se o uso de tecidos mais resistentes, como pulmão ou fígado, para obtenção de perfil genético de melhor qualidade.
- D O uso de tampões com nucleases auxilia na extração de DNA ao expor a molécula para posterior amplificação, o que permite obter perfis genéticos completos.
- E Mesmo com o avanço da tecnologia na área de genética forense, é necessária uma quantidade muito grande de DNA para obter perfil genético; por isso, amostras de volante e maçaneta nunca são analisadas.

Questão 69

Peritos foram chamados para atender a um local de homicídio no interior do estado. Na cena do crime, eles coletaram amostras, identificadas como Q1 e Q2, e encaminharam para posterior análise genética. Além dos perfis das amostras do local, também foram analisadas amostras da vítima e do perito responsável pelo plantão. Os resultados estão descritos na tabela a seguir.

marcador	Q1	Q2	vítima	perito
A0melogenina	X-X	X-Y	X-X	X-Y
D3S1359	10-11	10-11-15	10-11	15-15
D1S1656	14-16.3	14-15-16.3-18	14-16.3	15-18
D2S441	12-17	8-11-12-17	12-17	8-11
D10S1248	17-17	15-17	17-17	15-15
D13S317	7-8	7-8-9	7-8	8-9
Penta E	20-20	7-20-23	20-20	7-23
D16S539	10-13	10-12-13-16	10-13	12-16
D18S51	11-14	11-14-16	11-14	16-16
D2S1338	12-28	12-28	12-28	12-12

Durante os exames de local, constatou-se que o perito não utilizou os equipamentos de proteção individual (EPIs) corretamente e o local do crime não estava bem preservado.

Com relação à situação hipotética apresentada, assinale a opção correta.

- Ⓐ Para haver uma conclusão sobre essas amostras, é imprescindível a análise de mais marcadores genéticos, uma vez que a análise estatística só é possível com mais de vinte regiões analisadas.
- Ⓑ O perfil genético do perito foi observado na amostra Q1.
- Ⓒ O compartilhamento de alelos observados entre a vítima e o perito é observado somente em irmãos consanguíneos.
- Ⓓ A contaminação de amostras biológicas independe do uso de EPIs na análise de local de crime.
- Ⓔ Os alelos observados nas amostras da vítima e do perito estão presentes na amostra Q2, que provavelmente deve ter sido contaminada durante a análise da cena do crime, resultando nessa mistura de perfis genéticos.

Questão 70

A Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos (RIBPG) surgiu da iniciativa conjunta do Ministério da Justiça e das secretarias de segurança pública estaduais e tem por objetivo propiciar o intercâmbio de perfis genéticos de interesse da justiça, obtidos em laboratórios de perícia oficial.

Com base nessas informações, corresponde a uma das atribuições da RIBPG

- Ⓐ estabelecer requisitos mínimos para que um laboratório de perícia oficial de genética forense participe da RIBPG.
- Ⓑ padronizar procedimentos administrativos e estrutura hierárquica.
- Ⓒ permitir livre acesso aos bancos de perfis genéticos por qualquer funcionário do laboratório.
- Ⓓ determinar os procedimentos operacionais padrão (POP) que todos os laboratórios devem redigir.
- Ⓔ autorizar a inserção de perfis genéticos nos bancos da rede independente de critérios técnicos.

Questão 71

Em relação a isolamento e preservação de local de crime, assinale a opção correta.

- Ⓐ Populares que transitam pelo local do crime e até mesmo os policiais podem produzir, de forma intencional, vestígios ilusórios, que, portanto, não estão relacionados ao evento apurado.
- Ⓑ É responsabilidade do perito oficial criminal não alterar o estado das coisas.
- Ⓒ A necessidade de conhecer o fato é uma situação que justifica, como exceção à interdição rigorosa, a entrada da autoridade policial e de seus agentes no local de crime.
- Ⓓ O local inidôneo deve ser relatado pelo perito criminal, que, nesse caso, não poderá proceder aos exames periciais.
- Ⓔ Durante os procedimentos preliminares no local, quando houver pessoas ou animais dentro da área isolada ou potencialmente inovando a cena do crime, o perito criminal responsável pelos exames deverá solicitar a completa evacuação do local para iniciar o levantamento fotográfico.

Questão 72

Uma equipe pericial foi acionada para realizar exame de local de crime contra o patrimônio envolvendo violência e grave ameaça em uma residência. Posteriormente, a perícia foi também acionada para realizar exame em um veículo localizado que fora objeto de roubo na mesma ocorrência policial.

Considerando a situação hipotética apresentada, assinale a opção correta, acerca de postulados e princípios da doutrina criminalística.

- Ⓐ A presença de manchas de sangue, armas, marcas de disparo de arma de fogo, projéteis e estojos deflagrados no interior da residência são vestígios característicos de emprego de violência durante a ação delituosa.
- Ⓑ Se, no exame de local, os vestígios se restringirem às dependências da residência, a descrição da vizinhança e das vias de acesso é irrelevante para a perícia criminal.
- Ⓒ O perito poderá estender o isolamento do local para além da residência, desde que a medida não comprometa o trânsito de veículos e pessoas nas imediações.
- Ⓓ No exame de veículo não importa, nesse caso, registrar o estado do bem patrimonial, visando sua avaliação econômica.
- Ⓔ Para o exame do veículo, pela natureza da ação delituosa, espera-se constatar sinais de arrombamento nas portas ou violação nos dispositivos de ignição do motor.

Questão 73

Com relação aos vestígios encontrados no local de acidente de trânsito, assinale a opção correta.

- Ⓐ Marcas de frenagem produzidas sobre a superfície de asfalto molhado apresentam-se de cor escura, em tons variados de cinza.
- Ⓑ A presença de fragmentos desprendidos dos veículos auxilia principalmente na determinação da posição de repouso final que os veículos assumem após um acidente.
- Ⓒ Em comparação com as marcas de frenagem comuns, as geradas pelo sistema de freio ABS são duráveis, de coloração escura e com estriações longitudinais paralelas.
- Ⓓ O deslocamento dos pneumáticos divergente da orientação indicada pelo eixo longitudinal do veículo produz marcas de forma curvilínea e hachuradas.
- Ⓔ O rolamento dos pneumáticos sobre a superfície da pista produz marcas de sulcagens que auxiliam na determinação de trajetórias e na identificação de determinado pneumático de um veículo suspeito.

Questão 74

A forma das lesões permite razoavelmente caracterizar o tipo de instrumento utilizado em um crime contra a pessoa. Nesse sentido, é correto afirmar que

- Ⓐ instrumentos perfurantes produzem lesões punctórias, que se apresentam de pequeno diâmetro e de raro sangramento.
- Ⓑ as lesões cortantes possuem bordas regulares e comprimento menor que a profundidade.
- Ⓒ a cauda de escoriação é uma característica típica de lesões provocadas por projétil expelido por arma de fogo.
- Ⓓ as lesões produzidas por mordedura provocada pela arcada dentária humana são classificadas como cortocontundentes.
- Ⓔ as feridas causadas por instrumentos cortocontundentes, em razão da transferência de energia cinética de forma mista, apresentam sangramento maior que as lesões causadas por instrumentos cortantes.

Questão 75

Ao realizar exame perinecropsóptico em um cadáver em local de homicídio, o perito constatou uma ferida produzida por projétil expelido por arma de fogo. O corpo do cadáver apresentava um orifício (O1) na região abdominal e um orifício (O2) nas costas. O orifício O1 tinha bordas evertidas e formato irregular. O orifício O2 tinha bordas invertidas, formato elíptico e era circundado por diversas incrustações na pele, formando ferimentos puntiformes resistentes a limpeza.

Considerando essa situação hipotética bem como a descrição e interpretação dos vestígios apresentada pelo perito criminal, assinale a opção correta.

- Ⓐ Quando o disparo foi realizado, a vítima estava defronte ao autor.
- Ⓑ O projétil apresentava incidência perpendicular quando atingiu o corpo da vítima.
- Ⓒ O disparo foi efetuado a longa distância.
- Ⓓ O orifício O1 apresentava maior diâmetro que o orifício O2.
- Ⓔ A aréola equimótica somente poderá ser observada no orifício O2.

Questão 76

Durante exame perinecropsóptico de cadáver em um local de morte violenta, foram constatados pelo perito criminal os seguintes sinais externos: pele anserina, cogumelo de espuma sobre a boca e narinas, mancha verde de putrefação no nível do esterno e destacamento da epiderme nas mãos e nos pés.

Nessa situação hipotética, os achados perinecropsópicos são indicativos de morte por

- Ⓐ sufocação indireta.
- Ⓑ soterramento.
- Ⓒ afogamento.
- Ⓓ asfixia por monóxido de carbono.
- Ⓔ esganadura.

Questão 77

De acordo com o conceito e a classificação de local de crime, assinale a opção correta.

- Ⓐ Local de crime consiste no lugar onde o crime foi consumado.
- Ⓑ Um local de homicídio em via pública onde se observa a presença de transeuntes é presumivelmente idôneo.
- Ⓒ Quanto à natureza do fato, os locais de crime são classificados com base no tipo penal que lhe deu origem.
- Ⓓ Quanto à situação, os locais de crime são classificados em preservados, violados e desfeitos.
- Ⓔ A residência onde ocorreu um homicídio e o veículo utilizado pelo autor para fuga após cometimento desse crime são considerados, respectivamente, área imediata interna e área mediata externa.

Questão 78

Peritos da Polícia Civil realizaram a reprodução simulada do crime que terminou com a morte de Fabiano, de 25 anos de idade, após briga durante a madrugada de sábado em uma boate em João Pessoa-PB. O indiciado por ter cometido o crime afirmou que agiu em legítima defesa depois de ter sido agredido pela vítima. No entanto, testemunhas informaram que a vítima havia sido covardemente agredida até cair desacordada e falecer no local.

Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta, acerca de reprodução simulada.

- Ⓐ O procedimento realizado pela polícia visa convencer o Ministério Público acerca das circunstâncias e da autoria do delito.
- Ⓑ É de suma importância que os peritos criminais conheçam os autos antes da realização da reprodução simulada.
- Ⓒ No caso em tela, a encenação do delito foi realizada pelo indiciado e pelas testemunhas concomitantemente no local, visando reproduzir com a maior fidedignidade possível as circunstâncias do fato.
- Ⓓ Deduz-se da situação narrada que a autoridade policial foi previamente autorizada pelo juiz para realizar a reprodução simulada do crime.
- Ⓔ Infere-se que a reprodução simulada foi realizada no local similar ao do crime e necessariamente em horário com boa luminosidade, visando facilitar a visualização das encenações.

Questão 79

Com relação aos procedimentos de documentação do local de crime, assinale a opção correta.

- Ⓐ A descrição do local deve partir do geral para o particular, em áreas externas, e do detalhe para a visão de conjunto, em áreas internas.
- Ⓑ Em regra, o levantamento fotográfico completo e minucioso do local dispensa a elaboração de croqui.
- Ⓒ A fixação do vestígio conforme se encontra no local é parte indispensável no laudo pericial e constitui etapa da cadeia de custódia.
- Ⓓ Os peritos devem fotografar o cadáver logo após a retirada das vestes, antes de se realizar o exame perinecropsóptico.
- Ⓔ Os croquis são representações esquemáticas do local do crime, que apresentam estimativas das dimensões e localização dos vestígios no espaço; os registros precisos e detalhados dos vestígios, quando necessários, são apresentados em plantas auxiliares.

Questão 80

As unidades de perícia bem equipadas e com profissionais capacitados e procedimentos padronizados são fundamentais para a produção da prova técnica e, conseqüentemente, para a qualificação da investigação criminal.

Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça — SENASP.
Procedimento Operacional Padrão: perícia criminal.
Brasília: Ministério da Justiça, 2013 (com adaptações).

Considerando o previsto nessa afirmativa, assinale a opção correta, acerca dos procedimentos de levantamento de local de crime.

- Ⓐ Ao chegar a um local de crime, a equipe pericial deve evitar receber quaisquer informações dos fatos, de modo a garantir a imparcialidade e a objetividade dos exames periciais.
- Ⓑ Objetos que não forem coletados pelos peritos criminais serão devolvidos no local aos respectivos donos, a critério da equipe pericial.
- Ⓒ Atualmente, o padrão de busca de vestígios padronizado para os locais de crime, indistintamente, é o de espiral, em que o foco inicial é o vestígio principal e, em seguida, a região periférica.
- Ⓓ Todo material biológico no local de crime deve ser considerado potencialmente infectante, tanto é assim que a coleta de vestígios dessa natureza será feita sempre com uso de luvas novas e descartáveis, que serão trocadas antes da manipulação de um novo vestígio.
- Ⓔ As armas de fogo devem ser acondicionadas e encaminhadas para exames posteriores exatamente como foram encontradas no local de crime.

Espaço livre