-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --

No que diz respeito ao atendimento pré-hospitalar nos casos de emergências diabéticas, julgue os itens que se seguem.

- 41** Caso um paciente que faça uso de insulina apresente coma hipoglicêmico, deve-se verificar se ele é insulínodépendente.
- 42** Na cetoacidose diabética, a vítima pode apresentar respiração irregular (respiração de Kussmaul), náuseas, alterações na consciência e poliúria.

Com relação aos aspectos que envolvem o plano de contingência em saúde, julgue os itens a seguir.

- 43** Em situações de grandes desastres, como inundações, a etapa de mitigação do processo de gestão do risco corresponde ao momento de recuperação dos danos causados pelo acidente.
- 44** No que se refere à ameaça causada por agentes químicos, deve-se considerar a definição de limites de zonas de trabalho, em que se postula que, na zona morna, será estabelecida a logística do atendimento, o que inclui estacionamento de viaturas e equipamentos, áreas de abrigo, descanso e alimentação.

Houve a necessidade de realizar o atendimento pré-hospitalar de uma criança de três anos de idade retirada do fundo de uma piscina após ser encontrada pela mãe.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens subsequentes.

- 45** Após a abordagem primária, de identificação e manejo das situações de ameaça à vida, é importante aquecer a criança, retirando suas roupas molhadas e envolvendo-a em lençóis ou cobertores secos.
- 46** A criança deve ser colocada em decúbito ventral com a cabeça lateralizada e deve-se realizar avaliação rápida da respiração para que ela se recupere da hipóxia.

No que se refere aos conceitos de epidemiologia em saúde, julgue os itens seguintes.

- 47** Vacinação de bloqueio é a intensificação da administração de uma vacina com o objetivo de impedir que um indivíduo doente transmita a outros do seu convívio uma doença transmissível contra a qual se dispõe de vacina.
- 48** Surto difere-se de epidemia, pois o surto possui relação com a mortalidade ou a letalidade dos casos; e a epidemia está relacionada ao aumento de casos associados ao conceito de morbidade.
- 49** Uma pessoa, ao ser vacinada, adquire a imunidade classificada como passiva e, ao ser infectada por um patógeno, adquire a imunidade classificada como ativa.
- 50** O fungo causador da paracoccidiodomicose é um patógeno de baixa infectividade, por ter baixa capacidade de causar infecção.

No que diz respeito às estratégias desenvolvidas pelo Ministério da Saúde e relacionadas à promoção da saúde no âmbito da atenção primária, julgue os próximos itens.

- 51** Na abordagem familiar, a equipe de atenção básica à saúde deve conhecer as especificidades de cada família e estabelecer seu genograma, identificando as relações e ligações da família com o meio em que ela vive.
- 52** As atividades físicas indicadas para o fortalecimento da pelve em gestantes são recomendadas somente após o parto.
- 53** Crianças com seis meses a dois anos de idade não devem receber alimentos ultraprocessados ou com adição de açúcares, mel ou adoçantes, sendo recomendada a oferta de alimentos *in natura* ou minimamente processados, a exemplo do leite (humano ou de outros animais) e de iogurtes naturais sem açúcares.
- 54** A definição atual de redução de danos está ancorada no conceito mais abrangente de ações e políticas públicas voltadas para a prevenção de danos, a exemplo da estratégia do projeto terapêutico singular (PTS), não restringindo-se ao cuidado de pessoas que tenham problemas com álcool e outras drogas.

Em relação às doenças transmissíveis e às doenças crônicas não transmissíveis, julgue os itens a seguir.

- 55** A síndrome metabólica é um transtorno complexo usualmente relacionado a deposição central de gordura, hipertensão arterial, diabetes tipo 2 e dislipidemia, que representam um conjunto de fatores de risco para o aumento da mortalidade geral por doenças cardiovasculares.
- 56** Na elaboração de planos de cuidados de trabalhadores que, portadores de doenças crônicas, abusam da ingestão de álcool, deve-se enfatizar o uso adequado das medicações e esclarecer os reais riscos à saúde do uso do álcool e do não uso das medicações, pois muitos pacientes acreditam que, após o consumo de álcool, não se deve fazer uso delas.
- 57** O tabagismo, a inatividade física, a alimentação não saudável e o abuso de álcool são os fatores de risco para os seguintes quatro grupos de doenças crônicas de maior impacto mundial: diabetes, câncer, AIDS e covid-19.
- 58** Considere-se que uma pessoa portadora de doença infecciosa aguda procure atendimento em uma unidade básica de saúde. Nessa situação, o atendimento de enfermagem deve ser classificado como demanda espontânea, pois refere-se a atendimento não programado, a uma necessidade momentânea do usuário.
- 59** Em consulta de enfermagem, a avaliação do estado nutricional de paciente com diabetes tipo 2 deve ser realizada por meio da medida da circunferência abdominal, pois o índice de massa corporal, que é a relação entre peso e altura, não é um dado fidedigno, uma vez que o índice de massa muscular daqueles que praticam atividade física regularmente é proporcionalmente maior que o de gordura corporal.

Com referência à assistência de enfermagem à saúde mental do trabalhador e às doenças ocupacionais, julgue os itens que se seguem.

- 60** A internação psiquiátrica de trabalhador com quadro depressivo relacionado ao trabalho é um importante recurso protetivo e prescinde de laudo médico, dada a necessidade de afastamento imediato do trabalho.
- 61** Considere-se que um trabalhador compareça a um posto de enfermagem do trabalho e informe sentir-se deprimido e com ideação suicida e, após escuta qualificada, aconselhamento e afastamento do trabalho, retorne e relate sentir-se melhor. Nessa situação hipotética, o relato de melhora do trabalhador indica a efetividade do atendimento e a redução que o risco de suicídio ficou bastante reduzido.
- 62** Suponha-se que uma refinaria de petróleo tenha dois mil trabalhadores e que um hospital tenha seiscentos trabalhadores. Nessa situação, é obrigatória a assistência de enfermeiro(a) do trabalho nos serviços especializados de saúde, segurança e engenharia do trabalho apenas no hospital.
- 63** Quadros psicopatológicos específicos, como a síndrome de Burnout, que se caracteriza por exaustão emocional, despersonalização e autodepreciação, estão associados aos contextos de trabalho restritos às profissões ligadas à prestação de cuidados e assistência a pessoas em situações economicamente críticas e de carência.
- 64** Os profissionais de enfermagem da rede de saúde devem estar qualificados para estabelecer as relações entre as condições de vida e saúde-doença e o trabalho, atual ou progresso do usuário, com a prerrogativa de notificação ao sistema de informação em saúde.
- 65** A prevenção das LER/DORT requer adoção de medidas para a eliminação ou o controle da exposição aos fatores de risco, com a participação dos trabalhadores e da equipe multidisciplinar, entretanto o diagnóstico e o tratamento desses distúrbios, por serem complexos, devem ser realizados pelo médico do trabalho.

Uma equipe de trabalhadores civis foi designada para realizar trabalhos de campo em localidade remota no norte do país, sem acesso a saneamento básico e onde foram identificados casos de febre tifoide.

Considerando a situação hipotética apresentada, julgue os itens subsequentes, acerca da vigilância sanitária, em especial em saúde do trabalhador.

- 66** Os trabalhadores em questão deverão receber prévia imunização contra a febre tifoide.
- 67** Como a febre tifoide é doença de transmissão hídrica, além de serem tomadas as medidas de higiene em relação ao preparo de alimentos, o cozinheiro da equipe deverá ser submetido periodicamente a coprocultura, com vistas à pesquisa do agente causador da doença.
- 68** A vigilância epidemiológica em relação a esses trabalhadores abrange ações como o conhecimento do comportamento da febre tifoide na população local, a identificação dos fatores de risco relativos à doença e a recomendação de medidas de prevenção, vigilância e controle da doença.
- 69** A análise da situação de saúde desses trabalhadores pela enfermagem da empresa requer tão somente informações de morbimortalidade que possibilitem a compreensão e a intervenção nos problemas de saúde específicos e exclusivamente relacionados ao trabalho.
- 70** Considerando-se que a prevalência de hepatite D é mais elevada no norte do país, é importante verificar o estado imunológico dos trabalhadores em relação à hepatite B e vacinar os indivíduos suscetíveis, pois essa é uma forma de proteção indireta contra a hepatite D.

Acerca da normatização relacionada à saúde do trabalhador, julgue os itens a seguir.

- 71** Inclusão de todos trabalhadores brasileiros no sistema nacional de promoção e proteção da saúde, estruturação de rede integrada de informações em saúde do trabalhador e adoção de medidas especiais para atividades laborais de alto risco estão entre as diretrizes da Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho.
- 72** O transporte de volumes superiores a 100 litros de inflamáveis líquidos ou gasosos liquefeitos é classificado como atividade em condição de periculosidade.
- 73** A integração entre a vigilância em saúde do trabalhador e a atenção primária em saúde é uma estratégia da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora.
- 74** Pneumoconioses, transtornos mentais relacionados ao trabalho e dermatoses ocupacionais são eventos que devem ser obrigatoriamente notificados por meio do Sistema de Informação de Agravos de Notificação.

Acerca da regulamentação dos requisitos de segurança, saúde e condições de vivência no trabalho a bordo de plataformas de petróleo, julgue os itens que se seguem.

- 75** No caso de necessidade de remoção emergencial para trabalhador que necessite de transferência para unidade de saúde em terra, com resgate realizado por aeronave do tipo Evacuação Aeromédica (EVAM), a aeronave deverá decolar em até 20 minutos após seu acionamento pelo médico regulador.
- 76** Toda plataforma de petróleo deve contar com Serviço Especializado em Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) a bordo, ainda que seja complementar.

A respeito do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO), julgue os itens a seguir.

- 77** O PCMSO deve incluir a avaliação semestral da saúde dos empregados em atividades críticas, entendidas como as atividades que expõem os empregados a riscos iminentes.
- 78** O exame clínico demissional do PCMSO deve ser feito até o término do contrato do empregado.
- 79** O indicador biológico de exposição excessiva do etil benzeno é a soma dos ácidos mandélico e fenilgloxílico na urina.
- 80** Se, no exame periódico do empregado, for detectado agravamento de doença relacionada ao trabalho, deverá ser emitida Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT) independentemente de o empregado ser ou não afastado do trabalho.

Acerca dos riscos de natureza ocupacional, julgue os próximos itens.

- 81** O diagnóstico mais provável para um trabalhador que apresenta perda auditiva de início súbito após uma explosão no ambiente de trabalho é perda auditiva induzida por ruído (PAIR) ocupacional.
- 82** Os hidrocarbonetos clorados, a exemplo do benzeno, possuem efeito deletério predominantemente sobre o sistema hematopoiético, enquanto os hidrocarbonetos aromáticos, como o xileno, atuam sobre o fígado e os rins.
- 83** Vapor é definido como o estado de uma substância que, em condições normais de temperatura e pressão, permanece no estado líquido.

Acerca dos equipamentos de proteção individual (EPIs), julgue os itens a seguir.

- 84** Cabem ao trabalhador a limpeza, a guarda e a conservação do EPI.
- 85** Tanto o EPI de fabricação nacional quanto o importado só pode ser vendido ou utilizado no Brasil com a indicação do Certificado de Aprovação (CA), expedido pelo órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho.

Considerando aspectos da prática profissional em enfermagem e informações em saúde presentes nas publicações reconhecidas pelo Ministério da Saúde, julgue os itens que se seguem.

- 86** Legalmente, o prontuário do paciente é propriedade do estabelecimento de saúde, tendo o paciente direito de acesso aos dados nele contidos.
- 87** Uma ação de enfermagem recomendada em caso de arritmia cardíaca é transmitir segurança ao paciente para diminuir sua ansiedade.
- 88** Em casos de asma e enfisema, é permitido que um técnico em enfermagem realize a oxigenoterapia a seu critério.
- 89** As ações de natureza complementar de controle de risco são desenvolvidas conjuntamente por profissionais de enfermagem e de outras áreas da saúde.
- 90** A sistematização da assistência de enfermagem é uma forma planejada de prestar cuidados aos pacientes.

A respeito de anatomia, fisiologia, farmacologia e nutrição, julgue os próximos itens.

- 91** O líquido sinovial funciona como lubrificante em algumas articulações.
- 92** As glândulas que se localizam, duas a duas, ao lado da hipófise, no hipotálamo, são denominadas de para-hipófises.
- 93** Há tratamentos para os quais é previsto o uso da antibioticoterapia por toda a vida do paciente.
- 94** O uso de xaropes contra a tosse é fortemente recomendado para o tratamento da pneumonia.
- 95** Existem nutrientes mais importantes que outros no que se refere às funções que desempenham no organismo humano.
- 96** Uma alimentação variada e individualizada pode contribuir para manter saudável o organismo.

Com referência às leis e demais normas que estruturam e regem o sistema de saúde brasileiro, o exercício profissional da enfermagem e as práticas de biossegurança em saúde, julgue os itens subsequentes.

- 97** Todos os centros de material e esterilização devem possuir uma sala de desinfecção química.
- 98** A iniciativa privada é parte indissociável do Sistema Único de Saúde.
- 99** É dever ético do profissional de enfermagem esclarecer a coletividade acerca de direitos, benefícios, riscos e intercorrências associados à assistência de enfermagem.
- 100** Sacos de acondicionamento de resíduos sólidos provenientes de serviços de saúde podem ser esvaziados para fins de reaproveitamento, desde que atendam à norma ABNT NBR 9191/2000.

Espaço livre