-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --

Julgue os itens que se seguem, relativos a anatomia e fisiologia do sistema cardiovascular.

61 O coração, anatomicamente, localiza-se na cavidade torácica, atrás do osso esterno e acima do músculo diafragma.

62 As artérias coronárias estão entre as principais artérias do corpo humano e irrigam o músculo cardíaco.

63 A valva mitral está localizada entre o átrio e o ventrículo direitos.

64 A hematose, processo essencial para o funcionamento do sistema circulatório, acontece durante a circulação sistêmica do sangue.

65 O nó sinoatrial é considerado o marcapasso do coração.

Considerando as parasitoses existentes no Brasil, seus diferentes grupos microbianos, seu mecanismo de transmissão de doenças, as manifestações clínicas das principais doenças e as medidas de prevenção e tratamento, julgue os itens a seguir.

66 O vírus da dengue é um arbovírus transmitido pela picada da fêmea do mosquito *Aedes aegypti.* No Brasil, sua maior transmissibilidade ocorre nos meses mais chuvosos nas diferentes regiões do país. O acúmulo de água parada contribui para a proliferação desse mosquito e, consequentemente, para maior disseminação da doença.

67 Hábitos relacionados a higiene pessoal, como lavar bem as mãos com água e sabão antes das refeições e após usar o banheiro; manter as unhas aparadas; evitar colocar a mão na boca ou em mucosas, como nos olhos, são indispensáveis para controle, prevenção e manutenção de tratamento de inúmeras parasitoses, como amebíase e giardíase.

Considerando que o técnico de enfermagem precisa conhecer os princípios farmacológicos para garantir segurança no trabalho e a segurança do paciente, julgue os itens que se seguem.

68 A meia-vida de um medicamento é o tempo necessário para que 50% do fármaco seja excretado.

69 A administração de anti-inflamatórios intravenosos é privativa do enfermeiro.

70 O preparo e a administração de medicamentos, incluindo o acompanhamento do tratamento, são responsabilidades dos profissionais de enfermagem.

Considerados saberes validados pelo Ministério da Saúde acerca de assistência em saúde coletiva, julgue os itens que se seguem.

71 Normas que estabeleçam perfis determinados de pessoas mentalmente saudáveis facilitariam ações preventivas coletivas em saúde mental.

72 Um atendimento puerperal de qualidade prevê que as mães devem receber, entre outras orientações, esclarecimentos sobre eventuais direitos que possam ter junto à Previdência Social.

73 Orientar as pessoas sobre higiene pessoal e alimentação para evitar doenças diarreicas é ação suficiente para alterar as condições que geram ou perpetuam esse problema.

74 As chances de adoecimento e de morte variam em função de fatores como classe ou grupo social, cultura, raça, geração e gênero.

75 Identificar o que a população considera ser problemas coletivos de saúde é desimportante, já que reconhecer tais problemas sempre foi uma função indelegável dos profissionais de saúde.

Julgue os itens subsecutivos referentes a saberes reconhecidos pelo Ministério da Saúde associados à assistência a pacientes cirúrgicos.

76 A equipe de enfermagem pode providenciar assistência religiosa ao paciente cirúrgico, independentemente de solicitação feita por ele ou por sua família.

77 Unhas curtas contribuem para a prevenção de infecções hospitalares que podem prejudicar o paciente cirúrgico.

78 Recomenda-se explicar ao paciente e a seus familiares que uma razão de se cumprir jejum pré-operatório é evitar aspiração de resíduos alimentares pelo paciente anestesiado.

79 São raras as cirurgias em que ocorrem penetrações do trato respiratório e que podem ser classificadas como cirurgias limpas.

80 Entre os fatores físicos que elevam o risco cirúrgico estão o tabagismo, a desnutrição, a obesidade, a faixa etária elevada e a hipertensão arterial.

Julgue os itens que se seguem de acordo com saberes do campo da enfermagem para recém-nascidos, crianças e adolescentes veiculados pelo Ministério da Saúde.

81 O método neonatal canguru pode ser iniciado na unidade de tratamento intensivo, se for o caso.

82 Se o profissional de enfermagem tenta puncionar uma veia em uma criança e não consegue fazê-lo brevemente, deve deixar tal tarefa para outro membro da equipe, se houver, ou parar e tentar novamente mais tarde.

83 Procedimentos hospitalares em crianças devem ser explicados apenas aos responsáveis por elas e não diretamente às crianças, já que há uma confiança maior das crianças em seus responsáveis.

84 É recomendado conter crianças no leito, com ataduras ou outro tipo de material, especialmente as mais agitadas, independentemente do motivo dessa agitação.

85 A uma família que viva em habitação precária, sem acesso a água encanada ou filtrada e coleta adequada de lixo, mas com criança sofrendo de diarreia, uma orientação indicada é a de cavar uma fossa séptica para a decomposição da matéria orgânica.

Tomando-se em consideração conhecimentos e normativas validados por autoridades federais de saúde sobre assistência na emergência, na urgência, no trauma e na terapia intensiva, julgue os itens a seguir.

86 Mesmo sob terapia intensiva, o paciente consciente deve ser informado quanto aos procedimentos aos quais será submetido.

87 A possibilidade de punção venal mantém-se estável ao longo do tempo em pacientes em atendimento de emergência.

88 É eticamente permitido o atendimento de emergência sem consentimento do paciente porque a vida vale mais do que essa concordância.

89 Unidades de Terapia Intensiva Adulto, Pediátricas e Neonatais podem dividir a mesma sala, caso o hospital seja de pequeno porte.

90 Choque anafilático é aquele causado por perda de sangue ou por perda de líquido extracelular e plasma.

A dengue é tida como um dos maiores problemas de saúde pública do mundo, especialmente nos países tropicais, como o Brasil, cujas condições socioambientais favorecem o desenvolvimento e a proliferação de seu principal vetor, o mosquito *Aedes aegypti*. Acerca de aspectos diversos pertinentes a essa arbovirose, julgue os seguintes itens.

91 Pode haver transmissão da dengue pelo contato de um doente ou de suas secreções com uma pessoa sadia, bem como pelo contato dessa pessoa com fontes de água ou alimento contaminados pelas referidas secreções.

92 Originário do Brasil, o *Aedes aegypti* possui a cor escura, é rajado de amarelo nas patas e no corpo, e seu tamanho é um pouco menor que o de um pernilongo comum.

93 No seu ciclo de vida, o *Aedes aegypti* apresenta apenas três fases: ovo, larva e adulto.

94 Um ovo do *Aedes aegypti* poderá sobreviver por até 450 dias (aproximadamente 1 ano e 2 meses), mesmo que o local onde ele for depositado fique seco.

95 A fêmea do *Aedes aegypti* põe ovos de 4 a 6 vezes durante sua vida e, em cada vez, cerca de 100 ovos, em locais com água limpa e parada.

Acerca da hanseníase, doença infecciosa crônica de grande importância para a saúde pública devido à sua magnitude e ao seu alto poder incapacitante, julgue os itens que se seguem.

96 A classificação operacional do caso de hanseníase paucibacilar é determinada para casos com mais de cinco lesões de pele.

97 O *Mycobacterium leprae*, agente causador da hanseníase, não cresce em meios de cultura artificiais, ou seja, ele não é cultivável *in vitro*.

98 A hanseníase é transmitida exclusivamente pelo carrapato estrela.

99 Durante o exame físico de hanseníase, na avaliação do nervo ulnar, o paciente deve estar com o cotovelo estendido e a mão apoiada no braço do avaliador, que deverá examinar o ponto correspondente à goteira epitrocleana.

100 Devido ao padrão de multiplicação do *Mycobacterium leprae*, a hanseníase progride lentamente. Após o contato de um indivíduo com a pessoa doente, o aparecimento dos primeiros sinais da doença no indivíduo contatado pode levar, em média, de 2 a 5 anos.

Espaço livre