

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --**Questão 21**

Assinale a opção correta acerca de *delirium*.

- A O *delirium* é caracterizado por alteração crônica da consciência e de um ou mais domínios cognitivos ou comportamentais.
- B Idade maior ou igual a 75 anos não se caracteriza como fator predisponente para a ocorrência de *delirium*.
- C Distúrbios de sensopercepção, como alucinações ou ilusões, alterações comportamentais, como agressividade, apatia e medo, por exemplo, inversão do ciclo sono-vigília e distúrbios psicomotores são ausentes em quadros de *delirium*.
- D Os principais diagnósticos diferenciais de *delirium* são demência, depressão e quadros psicóticos, como o de esquizofrenia.
- E Infecções são descartadas como fatores precipitantes na investigação e abordagem do *delirium*.

Questão 22

Entre os transtornos mentais e comportamentais presentes no quadro de síndrome de abstinência devido ao uso de álcool, ocorre a hiperatividade do sistema nervoso central. No que se refere a esse quadro e a aspectos a ele relacionados, assinale a opção correta.

- A O Baclofeno é antagonista do receptor GABA-B.
- B Há aumento da atividade do GABA e redução da sensibilidade do receptor GABA-A.
- C Os fármacos mais utilizados no tratamento dessa síndrome são os antidepressivos inibidores seletivos de recaptação de serotonina (ISRS).
- D Nos casos em que houver suspeita de insuficiência hepática, deve ser descartado o uso de Lorazepam.
- E Entre os sinais e sintomas mais comuns desse quadro estão tremores, insônia, náusea e(ou) vômitos, agitação psicomotora, ansiedade e, em alguns casos, convulsões.

Questão 23

Considerando o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas sobre esquizofrenia, publicado pelo Ministério da Saúde em 2013, assinale a opção correta.

- A A identificação da doença em seu estágio inicial e o encaminhamento ágil e adequado para o atendimento especializado são de competência da atenção básica.
- B Intervenções biológicas não farmacológicas como a eletroconvulsoterapia (ECT) não potencializam o tratamento medicamentoso, por isso são sempre contraindicadas.
- C Pacientes com diagnóstico de esquizofrenia com risco de suicídio atual e aqueles que desenvolverem discinesia tardia com repercussão significativa deverão ser tratados com clozapina.
- D A clozapina é considerada de eficácia semelhante à de outros antipsicóticos, não apresentando maior relevância no tratamento de quadros refratários ou resistentes.
- E No caso de aumento de prolactina (nível sérico acima de 25 ng/mL nas mulheres e acima de 20 ng/mL nos homens) acompanhado ou não de galactorreia, irregularidades menstruais ou alterações de libido durante o uso de risperidona, deve haver indicação de troca por outro antipsicótico.

Questão 24

Assinale a opção correta acerca do tratamento psicofarmacológico do transtorno afetivo bipolar (TAB).

- A Clozapina é considerada a primeira linha de tratamento tanto para mania e depressão bipolar quanto para manutenção no TAB tipo I e TAB tipo II.
- B O uso de antidepressivos constitui risco absoluto de indução de virada maníaca, por isso é sempre contraindicado.
- C Deve-se evitar a prescrição de lítio e divalproato de sódio juntos, visto que os dois medicamentos são estabilizadores de humor.
- D Independentemente do perfil do paciente, o lítio é considerado sempre a primeira opção terapêutica.
- E O tratamento psicofarmacológico deve ser prescrito de acordo com a fase em que o paciente se encontre, a eficácia esperada do medicamento, o perfil de efeitos colaterais e o perfil do paciente.

Questão 25

São sinais ou sintomas tipicamente associados à depressão

- I sentimentos de inutilidade;
- II perda de peso;
- III pensamentos recorrentes de morte;
- IV anedonia.

Assinale a opção correta.

- A Apenas os itens I e II estão certos.
- B Apenas os itens I e IV estão certos.
- C Apenas os itens II e III estão certos.
- D Apenas os itens III e IV estão certos.
- E Todos os itens estão certos.

Questão 26

Assinale a opção correspondente ao transtorno psiquiátrico mais comum durante o período perinatal.

- A esquizofrenia
- B estresse pós-traumático (TEPT)
- C depressão
- D déficit de atenção e hiperatividade (TDAH)
- E autismo

Questão 27

A respeito do uso de psicofármacos durante a gestação, julgue os itens a seguir.

- I Quetiapina é um fármaco que produz sintomas perinatais, por isso deve ser evitado na gestação.
- II Sertralina é um fármaco conhecido por causar danos relacionados ao processo de neurodesenvolvimento, por isso sua prescrição não é recomendável na gestação.
- III Ácido valproico possui efeito teratogênico, por isso não deve ser usado na gestação.

Assinale a opção correta.

- A Apenas o item II está certo.
- B Apenas o item III está certo.
- C Apenas os itens I e II estão certos.
- D Apenas os itens I e III estão certos.
- E Todos os itens estão certos.

Questão 28

São considerados fatores de risco para transtornos mentais no puerpério:

- I antecedentes pessoais de transtorno do humor;
- II complicações obstétricas na gestação;
- III problemas de saúde do bebê;
- IV dificuldades de amamentação.

Assinale a opção correta.

- A Apenas os itens I, II e III estão certos.
- B Apenas os itens I, II e IV estão certos.
- C Apenas os itens I, III e IV estão certos.
- D Apenas os itens II, III e IV estão certos.
- E Todos os itens estão certos.

Questão 29

Em relação ao transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), assinale a opção correta.

- A O uso de inibidores da recaptação de serotonina (seja o tricíclico Clomipramina, sejam os ISRS) e a terapia cognitiva comportamental são tratamentos de primeira linha para TOC.
- B O diagnóstico desse transtorno demanda primordialmente realização de tomografia de crânio e eletroencefalograma.
- C A prevalência estimada de TOC na população geral é de 15% a 20%.
- D Para estabelecimento do diagnóstico de TOC, é obrigatória a presença de obsessões associadas a compulsões.
- E A maioria dos casos com início na infância é composta por meninas.

Questão 30

Julgue os próximos itens, em relação ao transtorno de ansiedade social (TAS).

- I O TAS é um dos transtornos mentais mais prevalentes, com taxas de 13% ao longo da vida.
- II O TAS tem risco aumentado para transtorno depressivo maior, transtorno por uso de substância e doenças cardiovasculares.
- III Em geral, são encontradas taxas mais altas de TAS no sexo feminino que no masculino.

Assinale a opção correta.

- A Apenas o item I está certo.
- B Apenas o item II está certo.
- C Apenas os itens I e III estão certos.
- D Apenas os itens II e III estão certos.
- E Todos os itens estão certos.

Questão 31

Calosidades autoprovocadas no dorso das mãos (sinal de Russell) são tipicamente observadas no quadro de

- A transtorno delirante somático.
- B transtorno obsessivo-compulsivo.
- C bulimia nervosa.
- D transtorno explosivo intermitente.
- E transtorno escoriativo.

Questão 32

A respeito de transtorno do pânico, assinale a opção correta.

- A Os ataques de pânico são um fator protetor para o desenvolvimento da agorafobia.
- B Os ataques de pânico são exclusivos do transtorno de pânico.
- C São sintomas centrais para o diagnóstico de ataque de pânico as preocupações persistentes sobre a ocorrência de ataque adicional ou sobre as implicações do ataque.
- D Os ataques de pânico devem-se aos efeitos fisiológicos diretos de psicoestimulante.
- E A frequência dos ataques de pânico indica a gravidade da doença.

Questão 33

Em relação a transtorno factício e simulação, assinale a opção correta.

- A Não há autoprodução de lesões no quadro de transtorno factício.
- B A presença de um ganho externo, como, por exemplo, aposentadoria, é o principal fator que diferencia a simulação do transtorno factício.
- C A comunicação de ideação suicida é forte indício de que o paciente não é um simulador.
- D No transtorno factício, os pacientes se submetem a menos riscos de iatrogenia ao acessarem os serviços de saúde.
- E Há alto grau de empatia das equipes que tratam pacientes com transtorno factício, de forma que eles são rapidamente referenciados para tratamento, sem que as equipes se sintam ludibriadas.

Questão 34

Assinale a opção correta em relação aos transtornos de personalidade.

- A No quadro de transtorno paranoide da personalidade, o indivíduo supervaloriza sua própria importância, considerando as próprias ideias como as únicas corretas e não aceitando que seus pontos de vista sejam contestados.
- B No quadro de transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, ocorrem frequentemente pensamentos intrusivos, recorrentes e egodistônicos.
- C Sedução e manipulação, mentiras e fantasias, ausência de afeto, amoralidade, incorrigibilidade, adaptação social precária e delinquência são algumas características do quadro de transtorno de personalidade emocionalmente instável.
- D Pacientes com transtorno de personalidade *borderline* frequentemente apresentam episódios psicóticos graves e duradouros.
- E O diagnóstico de transtorno de personalidade pode ser atribuído a indivíduos com menos de dezoito anos de idade.

Questão 35

No que se refere ao transtorno de somatização, assinale a opção correta.

- A Paralisias, cegueira e mutismo são os sintomas mais comuns do transtorno em questão.
- B Homens e mulheres são igualmente afetados pelo referido transtorno.
- C O referido transtorno é polissintomático e se inicia antes dos trinta anos de idade.
- D Os transtornos de somatização têm sempre uma causa orgânica clara.
- E No transtorno somatoforme, o paciente muitas vezes tem uma preocupação em ter uma doença grave, com base na interpretação equivocada de sinais corporais fisiológicos.

Questão 36

A respeito de transtornos do sono, assinale a opção correta.

- A A síndrome de Kleine-Levin caracteriza-se classicamente por episódios de hipersonia, perda de apetite e alterações comportamentais.
- B Em paciente com diagnóstico de depressão, a alteração de sono mais típica é o terror noturno.
- C O sonambulismo ocorre mais frequentemente em adultos.
- D Medicamentos hipnótico-sedativos mais modernos, como o zolpidem, não causam dependência.
- E A narcolepsia é usualmente tratada com anfetaminas e metilfenidato.

Questão 37

Paciente do sexo masculino, com vinte e quatro anos de idade, relatou ao médico de plantão que o atendeu em hospital público, que estava em uma festa quando o local fora atacado por terroristas que provocaram várias mortes. Referiu que fora socorrido, mas que, nas semanas seguintes, passara a apresentar insônia e pesadelos, nos quais revivia a experiência do evento, e deixara de se relacionar com as pessoas que encontrara no dia do ocorrido, porque sentia ansiedade intensa quando imaginava encontrá-las. Solicitou, por fim, uma licença por se sentir incapaz de exercer suas atividades laborativas.

No caso clínico acima descrito, o diagnóstico mais provável para o paciente em questão é de transtorno

- A do estresse pós-traumático.
- B dissociativo.
- C de personalidade evitativa.
- D depressivo.
- E de ansiedade generalizada.

Questão 38

Considerando as características de diversas síndromes que resultam em prejuízo no comportamento adaptativo, assinale a opção correta.

- A Microcefalia, convulsões, coreoatetose, espasticidade e comportamento autoagressivo são características da síndrome de Down.
- B Genótipo com alterações normalmente no cromossomo 15 e fenótipo clínico caracterizado por hipotonia neonatal, e retardo de desenvolvimento seguido por desenvolvimento pós-natal de polifagia com subsequente obesidade, baixa estatura, hipogonadismo e retardo mental leve a moderado são características da síndrome de Prader-Willi.
- C Micrognatia, orelhas baixas, hipertelorismo, fissuras palpebrais oblíquas e anormalidades na laringe são características da síndrome do X frágil.
- D Macrocefalia, lábios grossos, narinas alargadas e ponte nasal baixa são características da síndrome de Lesch-Nyhan.
- E Pregas epicantais, fendas palpebrais oblíquas, nariz achatado e pele abundante no pescoço são características da síndrome de Hurler.

Questão 39

Em relação ao transtorno dissociativo de personalidade (TDI), assinale a opção correta.

- A A amnésia em indivíduos com TDI se limita a eventos estressantes ou traumáticos.
- B É comum que indivíduos com TDI exagerem seus sintomas amnésicos.
- C A prevalência do TDI é três vezes maior em indivíduos do sexo masculino que nos do sexo feminino.
- D A maioria dos estados de posseção no mundo geralmente não é patológica, estando associada a práticas religiosas, e não satisfaz os critérios de TDI.
- E Indivíduos com TDI raramente apresentam comorbidades.

Questão 40

Acerca de transtornos dissociativos, assinale a opção correta.

- A A amnésia dissociativa generalizada costuma ter um início insidioso.
- B Sintomas transitórios de despersonalização e desrealização são raros na população geral.
- C Indivíduos com amnésia dissociativa frequentemente percebem seus problemas de memória.
- D Comportamentos suicidas e outros comportamentos autodestrutivos são raros em indivíduos com amnésia dissociativa.
- E A forma mais comum de amnésia dissociativa é a amnésia localizada, ou seja, a impossibilidade de recordar eventos durante um período limitado de tempo.

Questão 41

Um psiquiatra é chamado para avaliar um homem saudável de 85 anos de idade que está redigindo um novo “testamento” e está preocupado que ele possa ser contestado no pós-morte com base em uma possível diminuição da capacidade mental.

Nesse caso, a avaliação psiquiátrica desse paciente tem o propósito de determinar

- A sanidade *versus* insanidade.
- B a capacidade de distinguir o certo do errado.
- C o discernimento.
- D a capacidade testamentária.
- E a capacidade de julgamento.

Questão 42

Uma mulher de 40 anos de idade, com uma história de relacionamentos interpessoais caóticos, inicia psicoterapia psicanalítica. Ela alterna entre períodos nos quais idealiza o terapeuta e a terapia e períodos de irritação e de raiva, quando nada relativo ao terapeuta ou à terapia é bom, tanto agora quanto no passado.

A referida paciente apresenta um quadro que é exemplo do mecanismo de defesa conhecido como

- A divisão.
- B formação reativa.
- C negação.
- D projeção.
- E anulação.

Questão 43

Uma mulher de 22 anos é admitida no Hospital devido à anestesia da mão direita que se desenvolveu após uma discussão com seu irmão. Ela está bem disposta e parece despreocupada quanto ao seu problema. Não há história de trauma físico. O exame neurológico é negativo exceto pela sensibilidade à dor diminuída em uma distribuição de luva sobre a mão direita. Sua família inteira está presente e expressando grande preocupação e atenção. Ela ignora seu irmão e parece alheia ao ciúme e à rivalidade crônicos descritos por sua família.

Nesse caso, o diagnóstico mais provável é de

- A transtorno dismórfico corporal.
- B transtorno de personalidade histriônica.
- C histeria.
- D tumor cerebral parietal.
- E transtorno de conversão.

Questão 44

Assinale a opção que apresenta a demência caracterizada por: cognição flutuante com variações importantes da atenção e do estado de alerta; alucinações visuais recorrentes, que são tipicamente bem formadas e detalhadas; quedas repetitivas; hipersensibilidade a antipsicóticos; e parkinsonismo.

- A demência por corpos de Lewy
- B demência do Parkinson
- C demência da paralisia supranuclear progressiva
- D degeneração gangliônica corticobasal
- E degeneração olivopontocerebelar

Questão 45

Assinale a opção que indica a doença que representa o protótipo da demência cortical cujo substrato neuropatológico são placas neuríticas e enovelados neurofibrilares.

- A vascular
- B Wenicke-korsakoff
- C Parkinson
- D Alzheimer
- E Huntington

Questão 46

Assinale a opção que apresenta o estabilizador de humor que, devido ao efeito colateral de rash cutâneo, deve ser administrado lentamente no tratamento do transtorno bipolar.

- A** lítio
- B** oxcarbazepina
- C** lamotrigina
- D** topiramato
- E** valproato de sódio

Questão 47

Uma mulher de 43 anos de idade, com longa história de esquizofrenia, tem relatado queixas de perda de visão noturna.

Nesse caso, o medicamento que provavelmente causa esse efeito de que a paciente se queixa é o(a)

- A** haloperidol.
- B** tioridazina.
- C** risperidona.
- D** levomepromazina.
- E** clorpromazina.

Questão 48

Considerando-se o mecanismo neurobiológico da esquizofrenia, os efeitos colaterais motores dos antipsicóticos situam-se nos circuitos dopaminérgicos denominados

- A** infundibulares.
- B** mesolímbicos.
- C** nigroestriatal.
- D** corticoespinhais.
- E** mesocorticais.

Questão 49

A causa mais comum de hiperprolactinemia em paciente psiquiátrica é

- A** medicação neuroléptica.
- B** gravidez.
- C** contraceptivos orais.
- D** hipotireoidismo.
- E** cirrose.

Questão 50

A ocorrência de delírios em um indivíduo de 35 anos de idade e sem história conhecida de esquizofrenia ou de transtorno delirante deve sempre alertar o médico para a possibilidade de

- A** agorafobia.
- B** frotteirismo.
- C** transtorno do sono.
- D** abuso de substância.
- E** transtorno dissociativo.

Espaço livre