

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --**Questão 26**

A respeito do planejamento das displasias severas da maloclusão esquelética em cirurgias ortognáticas, julgue os itens a seguir.

- I Na avaliação clínica frontal da face em pacientes com deficiência maxilar laterolateral, é possível que haja exposição em excesso da esclera abaixo da íris.
- II A análise de Bolton é fundamental para a definição do quadro cirúrgico e consiste na medição dos diâmetros mesiodistais dos dentes incisivos e caninos superiores, que devem exceder em 30% os diâmetros mesiodistais dos dentes incisivos e caninos inferiores.
- III A retrusão mandibular é identificada quando a região submentoniana não está bem definida e o ângulo cervical está aberto ou obtuso (maior que 90°).
- IV A linha do sorriso é definida tão somente pelo comprimento do lábio superior, que deve ter, em média, 22 mm + ou – 2 mm.

Estão certos apenas os itens

- A I e II.
- B I e IV.
- C II e III.
- D III e IV.

Questão 27

Após a colocação de implante dentário na região posterior da mandíbula, determinado paciente manifestou o surgimento de sensação desagradável espontânea. Feita a análise da imagem tomográfica, o cirurgião bucomaxilofacial suspeitou da existência de possível lesão neuropráxica por invasão do espaço do canal mandibular pelo implante.

Considerando-se o padrão de resposta periférica às lesões e o caso hipotético descrito, o provável perfil de reparo da estrutura nervosa é atribuído pela

- A desmielinização.
- B degeneração waleriana.
- C formação de neuroma.
- D degeneração axonal.

Questão 28

No que se refere à avaliação do tecido ósseo de suporte necessário, nas cirurgias pré-protéticas, para melhor adaptação das próteses dentárias, é correto afirmar que

- A a palpação oferece maior precisão na análise da anatomia transversal da mandíbula, que envolve a configuração do osso basal, o rebordo alveolar e a localização do nervo alveolar inferior.
- B a remoção da incisura posterior à tuberosidade é necessária para a estabilização e o selamento periférico da prótese posterior.
- C a adequada dimensão horizontal na primeira e a adequada dimensão vertical na segunda devem ser consideradas para a correta relação anteroposterior e vertical maxilomandibular.
- D o excesso vertical da tuberosidade, tanto ósseo quanto de tecido mole, pode interferir no espaço necessário para a instalação de uma prótese adequadamente confeccionada.

Questão 29

Para o correto diagnóstico de patologias ósseas, como o ameloblastoma, o mixoma, o fibroma ameloblástico, entre outras, é essencial a identificação de características específicas em imaginologia. A esse respeito, assinale a opção correta.

- A O ameloblastoma pode conter septos curvos, mas geralmente tende a crescer ao longo do osso sem expansão óssea vestibular ou lingual acentuada, característica do tumor odontogênico queratocístico.
- B O ameloblastoma apresenta características semelhantes às do fibroma ameloblástico, no qual os septos são mais definidos e grosseiros.
- C O ameloblastoma distingue-se do mixoma, embora ambos possam apresentar septos de aparência semelhante, visto que uma das características do mixoma é a presença de um ou dois septos retos e finos perpendicularmente orientados.
- D O ameloblastoma, além de ocorrer em indivíduos de faixa etária mais jovem, apresenta septos mais mal-definidos, granuloso ou finos, quando comparado à lesão central de célula gigante.

Questão 30

A respeito das intervenções em cirurgias ortognáticas e das osteotomias funcionais da face, julgue os itens subsecutivos.

- I A osteotomia Le Fort I segmentada é indicada para casos de separação paramediana única limitados à expansão de 2 a 4 mm, e pode, em uma segunda separação paramediana do lado contralateral, atingir de 4 a 6 mm.
- II A distração osteogênica da mandíbula é indicada para o tratamento da micrognatia em bebês e crianças com síndromes craniofaciais e permite a desobstrução das vias aéreas, reduzindo-se o risco de apneia obstrutiva do sono.
- III A osteotomia em L invertido da mandíbula é a técnica de escolha para avanços extensos (superiores a 12 mm) com rotação anti-horária, mas é contraindicada para grandes recuos (superiores a 10 mm).
- IV A osteotomia sagital bilateral dos ramos mandibulares é a técnica mais adequada para o fechamento de mordida aberta com avanço mandibular e movimento anti-horário, devido à elevada estabilidade.

Estão certos apenas os itens

- A I e II.
- B I e IV.
- C II e III.
- D III e IV.

Questão 31

Com relação aos hemangiomas, assinale a opção correta.

- A A vincristina intravenosa (IV) tem sido considerada uma droga de escolha para lesões complicadas que não são responsivas a outras terapias.
- B Os hemangiomas congênitos e as malformações vasculares congênitas são mais comuns em indivíduos do sexo masculino e apresentam, em sua maioria, autorremissão na primeira infância.
- C O manejo cirúrgico precoce na infância deve ser descartado devido ao elevado risco de hemorragia e proliferação da lesão.
- D A terapia farmacológica com o betabloqueador propranolol tem sido abandonada, devido ao risco relatado de diplegia espástica permanente.

Questão 32

Mulher de 73 anos de idade, ao procurar o serviço de cirurgia bucomaxilofacial, relatou desconforto devido a alteração em sua saliva e uso contínuo de medicamento cujo nome não se lembrava. Na análise clínica, constatou-se elevada produção salivar característica de sialorreia. Nesse caso, o fármaco que poderia ter provocado o quadro de sialorreia é

- A lorazepam.
- B clozapina.
- C escopolamina.
- D floxetina.

Questão 33

De acordo com a resolução do Conselho Federal de Odontologia, a atuação do cirurgião dentista no exercício da Odontologia legal

- A inclui a emissão de pareceres, atestados, inclusive de óbito, perícia em foro civil, criminal e trabalhista e traumatologia odonto-legal.
- B engloba todas as atividades de odontologia forense, seja em vivo ou em morto, íntegro ou em suas partes em fragmento e na elaboração de perícias, atestados e determinação da causa da morte.
- C compreende as atividades de perícia, seja em vivo ou morto, com intuito de avaliação forense ou administrativa, estendendo-se à análise criminal e balística podendo se estender a todas as outras áreas da medicina legal.
- D restringe-se à análise, perícia e avaliação de eventos relacionados com a área de competência do cirurgião-dentista, podendo, se as circunstâncias o exigirem, estender-se a outras áreas.

Questão 34

A contaminação cruzada é um risco que pode colocar em perigo a saúde de pacientes e profissionais. Quanto ao controle de infecção durante o atendimento odontológico, assinale a opção correta.

- A Desinfecção de alto nível é processo físico ou químico que destrói todos os microrganismos de artigos semicríticos, inclusive micobactérias e fungos e todas as formas viáveis de esporos bacterianos.
- B Produtos para saúde classificados como críticos devem ser submetidos, no mínimo, ao processo de desinfecção de alto nível, após a limpeza e demais etapas do processo.
- C Considera-se um artigo estéril se a probabilidade de sobrevivência dos microrganismos contaminantes for menor do que 1:1.000.000.
- D É recomendado que a frequência dos testes biológicos, indicadores utilizados para o controle da esterilização, seja semestral.

Questão 35

Em relação à anatomia facial e oral, assinale a opção correta.

- A Os vasos e nódulos linfáticos tem grande importância no estudo da propagação de infecções e tumores malignos de cabeça e pescoço.
- B O músculo pterigoideo lateral durante a contração, é responsável pelo deslocamento para anterior, para lateral e para baixo da cabeça da mandíbula.
- C O nervo trigêmeo, quinto par de nervos cranianos, possui apenas função sensitiva e divide-se primariamente nos ramos oftálmico, maxilar e mandibular.
- D Se houver hemorragia transoperatória da artéria maxilar que não possa ser controlada pelos métodos hemostáticos locais, indica-se a ligadura da artéria carótida interna.

Questão 36

Após a extração dentária, um paciente de 28 anos de idade apresentou processo infeccioso agudo e grave com celulite do tecido conectivo cervical acometendo bilateralmente os espaços perimandibulares. Considerando essa situação hipotética, assinale a opção que corresponde ao diagnóstico mais provável e ao tratamento inicial adequado para o paciente em tela.

- A Angina de Ludwig; terapia antibiótica e drenagem cirúrgica.
- B Ranula cervical mergulhante; marsupialização ou excisão das glândulas submandibulares bilateralmente.
- C Parotidite endêmica viral; antitérmicos e bolsa morna na região entumecida.
- D Angina pectoris; administrar nitroglicerina sublingual.

Questão 37

A endocardite bacteriana é uma infecção grave que pode ter origem na bacteremia causada por tratamentos odontológicos.

Segundo a Associação de Cardiologia Americana, atualmente, o esquema de profilaxia mais seguro para pacientes de alto risco para endocardite bacteriana, que apresentam alergia à penicilina, inclui

- A Clindamicina 600 mg, via oral, 1 hora antes do procedimento.
- B Amoxicilina 2 g, via oral, 1 hora antes do procedimento.
- C Ampicilina 2 g, via intramuscular, 1 hora antes do procedimento.
- D Azitromicina 500 mg, via oral, 1 hora antes do procedimento.

Questão 38

A técnica de bloqueio nervoso descrita por Gow-Gates, quando bem dominada pelo cirurgião-dentista, traz vantagens que incluem maior taxa de sucesso e menor incidência de aspiração positiva. Essa técnica é utilizada para o bloqueio

- A de todos os nervos sensitivos do ramo mandibular do 5º par craniano.
- B dos nervos alveolares superiores posterior, médio e anterior.
- C dos nervos do ramo maxilar incluindo o nervo infra-orbitário.
- D de todos os nervos da região do palato incluindo o nasopalatino.

Questão 39

Com relação aos cistos e tumores odontogênicos, assinale a opção correta.

- A O cisto dentígero apresenta-se como uma lesão radiolúcida de bordas indefinidas, associadas geralmente a infecções endodônticas.
- B O queratocisto é um cisto odontogênico de desenvolvimento, tem aspecto radiopaco, e apresenta maior incidência em região de pré-molares superiores.
- C O ameloblastoma é um tumor odontogênico de crescimento lento, com características localmente invasivas, uni ou multicístico e com maior incidência em região posterior de mandíbula.
- D O cisto odontogênico calcificante é uma lesão inicialmente radiopaca, bem definida, de surgimento tardio, geralmente em idosos.

Questão 40

A tabela a seguir mostra o resultado de um estudo clínico hipotético com a participação de 1.500 pacientes, dos quais 560 eram pessoas expostas à determinada doença, mas que não a desenvolveram.

		desenvolveram a doença		total
		sim	não	
expostas	sim	240	560	800
	não	140	560	700
total		380	1.120	1.500

Considerando-se os dados da tabela, infere-se que a estatística denominada *risco relativo* (*relative risk*) é igual a

- Ⓐ 1.
- Ⓑ 12/7.
- Ⓒ 24/19.
- Ⓓ 3/2.

Espaço livre