

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --**Questão 26**

Cabe ao enfermeiro, privativamente,

- A** executar ações assistenciais de enfermagem.
- B** participar da programação da assistência de enfermagem.
- C** oferecer cuidados de enfermagem que exijam conhecimentos de base científica.
- D** realizar prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar.

Questão 27

Considere uma população com 999 pessoas e que está suscetível a uma doença Y no início do mês de novembro de 2021, a qual aumentou para 1001 pessoas ao fim do mesmo mês. Considere, ainda, que a doença Y tenha acometido dez pessoas da população no início desse mês e, em seguida, mais doze pessoas ao fim do mesmo mês, e que, ademais, foram registrados, no mês, mais quatro novos casos da doença.

Com base na situação hipotética apresentada, é correto afirmar que

- A** os dados apresentados são suficientes para se calcular a taxa de mortalidade da doença Y no mês de novembro de 2021.
- B** duas pessoas morreram devido à doença Y no mês de novembro de 2021.
- C** a incidência da doença Y no mês de novembro de 2021 é igual a 4/1000.
- D** a prevalência da doença Y no fim do mês de novembro de 2021 é igual a 12/1001.

Questão 28

Conforme a Lei n.º 8.080/1990, o município de Estância excederia as ações permitidas para exercício em seu âmbito administrativo, violando a lei e realizando um ato ilegal, ao

- A** elaborar a proposta orçamentária do Sistema Único de Saúde.
- B** propor a celebração de convênio internacional relativo ao meio ambiente.
- C** requerer, sob indenização, bens de empresas em situação transitória de calamidade pública para atendimento de necessidades coletivas urgentes.
- D** estabelecer parâmetros para o controle da qualidade sanitária de produtos de consumo humano.

Questão 29

Com base no vigente Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, assinale a opção correta.

- A** Inexiste responsabilidade do enfermeiro pela assistência prestada por estudantes, ainda que sob sua orientação.
- B** É permitido assinar ações de enfermagem executadas por outro enfermeiro, desde que delas tenha havido pleno conhecimento e prévia autorização.
- C** É direito do enfermeiro anunciar seus serviços, desde que tenha as respectivas habilidades e competências para exercê-los.
- D** É dever profissional requerer a quebra de vínculo da relação com usuários quando houver risco à integridade física do enfermeiro.

Questão 30

Tomando como base a Política Nacional de Atenção Básica, assinale a opção correta.

- A** Ainda que a atenção básica seja realizada por equipe multiprofissional, inexistente responsabilidade sanitária dessa equipe sobre o território definido para sua atuação.
- B** A integração da vigilância em saúde na atenção básica busca estabelecer processos de trabalho que levem em consideração determinantes, riscos e danos à saúde.
- C** A verticalização do cuidado é uma das diretrizes do SUS a se operacionalizar na atenção básica.
- D** Atenção básica e atenção primária à saúde são termos de significados distintos, ainda que parcialmente sobrepostos.

Questão 31

Com referência a aspectos da administração de materiais como ferramenta de gestão em saúde, especialmente o subsistema de catálogo de materiais (Catmat), assinale a opção correta.

- A** O uso do Catmat é obrigatório nas três esferas administrativas.
- B** A organização da informação no Catmat segue um padrão desenvolvido, originalmente, no Brasil pela Associação Brasileira de Normas Técnicas.
- C** A descrição do código do material no Catmat está dissociada da unidade de fornecimento desse material.
- D** Medicamentos e conjuntos médicos são classificados no Catmat na mesma classe, mas em grupos distintos.

Questão 32

Considerando os parâmetros mínimos estabelecidos para o dimensionamento do quantitativo de profissionais de enfermagem para os serviços e locais onde são realizadas as suas atividades, assinale a opção correta.

- A** O serviço de saúde é obrigado a contratar dez por cento a mais de profissionais para um setor, se mais da metade do quadro desse setor for constituído por pessoas maiores de cinquenta anos.
- B** O índice de segurança técnica para o acréscimo do quantitativo de profissionais para atuação na atenção básica é fixo e, portanto, não pode ser majorado pela iniciativa do serviço de saúde.
- C** Auxiliares de enfermagem em cuidados intensivos são vedados, mas são permitidos em cuidados semi-intensivos.
- D** O uso de sistema de classificação de pacientes para a determinação do quantitativo mínimo de horas de enfermagem para assistir pacientes de saúde mental é vedado.

Questão 33

No início da epidemia de AIDS e nos anos seguintes, o modelo de atenção às pessoas vivendo com HIV/AIDS (PVHIV) em serviços especializados, como os serviços de atenção especializada (SAE), mostrou-se o mais adequado e seguro.

Considerando essa afirmativa, assinale a opção correta, de acordo com a definição das fases de desenvolvimento da doença.

- Ⓐ A infecção aguda do HIV compreende o período de 0 a 4 semanas e é o tempo entre a infecção e o surgimento dos primeiros sinais e sintomas da doença. Nesse período, a pessoa pode apresentar hipertermia, sudorese, cefaleia, fadiga, faringite, exantemas, gânglios linfáticos aumentados e um leve prurido.
- Ⓑ A fase de latência clínica apresenta sinais e sintomas que variam de acordo com o agente causador da infecção oportunista e podem incluir fadiga não habitual, perda de peso, suor noturno, inapetência, diarreia, alopecia, xerodermia, entre outros.
- Ⓒ A fase assintomática é a fase da infecção na qual a pessoa começa a ter sinais e sintomas de doenças que são secundárias ao enfraquecimento do sistema imunológico.
- Ⓓ A síndrome da imunodeficiência adquirida ocorre após a fase aguda e geralmente não apresenta sinais e sintomas, embora o HIV esteja se multiplicando no organismo. A duração dessa fase é, em média, de 8 a 10 anos e pode variar de pessoa para pessoa.

Questão 34

Em relação ao modo de transmissão do HIV, assinale a opção correta.

- Ⓐ A transmissão do HIV pode acontecer por meio de relação sexual desprotegida, vaginal, anal ou oral, e picada de insetos.
- Ⓑ A transmissão do HIV não ocorre pelo uso de instrumentos que cortam ou perfuram, não esterilizados, como agulhas, lâminas de bisturi, instrumentos para tatuagem, *piercing*, manicure e pedicure.
- Ⓒ O HIV não é transmitido por meio de saliva, lágrima, espirro, suor e da mãe para a criança, durante a gravidez, parto, sem as ações de profilaxia ou durante a amamentação.
- Ⓓ Não se transmite HIV por meio de beijo, abraço, carícia, aperto de mão e uso compartilhado de talheres para alimentação.

Questão 35

A apresentação do diabetes tipo 1 é em geral abrupta, acometendo principalmente crianças e adolescentes sem excesso de peso. Com base no que dispõe a American Diabetes Association, 2013, e as orientações do Ministério da Saúde para o cuidado da pessoa com doença crônica, a respeito de diabetes, é correto afirmar que

- Ⓐ a meta de glicemia ao deitar/à noite para escolares com diabetes melito tipo I deve ser de 90 a 180 mg/dl.
- Ⓑ a meta de controle glicêmico pré-prandial para lactentes e pré-escolares com diabetes melito tipo 1 é de 100 – 180 mg/dl.
- Ⓒ adolescentes e adultos jovens com diabetes melito tipo I deve manter a glicemia pré-prandial entre 90 e 130 mg/dl e HbA1C < 8,5%.
- Ⓓ o percentual de HbA1C para escolares de 6 a 12 anos com diabetes melito tipo I deve estar > 9%.

Questão 36

A respeito das insulinas disponíveis no SUS, é correto afirmar que

- Ⓐ a insulina NPH tem início de 2 h a 4 h, com pico de 4 h a 10 h e aspecto turvo.
- Ⓑ a insulina regular tem início entre 30 e 60 min e duração de 8 h a 12 h.
- Ⓒ a insulina regular tem início entre 30 e 60 min, com pico de 2 h a 3 h e tem aspecto turvo.
- Ⓓ a insulina NPH tem início de 2 h a 3 h, e aspecto cristalino.

Questão 37

O Plano Nacional de Imunizações (PNI) é uma estratégia nacional adotada para erradicação de doenças por intermédio de vacinação definida em calendário pelo Ministério da Saúde. De acordo com o PNI, de 2021, assinale a opção correta.

- Ⓐ A vacina BCG deve ser administrada ao nascer, em duas doses, com intervalo de 15 dias.
- Ⓑ A vacina penta deve ser administrada em duas doses, sendo a 1.ª dose aos 2 meses e 2.ª dose aos 4 meses de idade.
- Ⓒ A vacina contra a febre amarela pode ser administrada simultaneamente com a vacina tríplice viral ou tetra viral em crianças menores de dois anos de idade.
- Ⓓ A vacina do rotavírus humano deve ser administrada em duas doses, sendo a 1.ª dose aos 2 meses e 2.ª dose aos 4 meses de idade.

Questão 38

Há situações que podem aumentar o risco de ocorrência de eventos adversos na pessoa a ser vacinada, ou que podem comprometer a capacidade da vacina de produzir imunidade. Para essas situações, é necessário adotar precauções, analisando cuidadosamente os benefícios e os riscos envolvidos.

A esse respeito, assinale a opção que apresenta a situação em que o Ministério da Saúde recomenda o adiamento da vacinação.

- Ⓐ Crianças em uso de doses maiores ou iguais a 2 mg/Kg/dia de prednisona ou equivalente e adolescentes em uso de doses maiores ou iguais a 10 mg/dia de prednisona ou equivalente.
- Ⓑ Pessoas com doenças febris graves, sobretudo para que seus sintomas (sinais) ou eventuais complicações não sejam atribuídos à vacinação.
- Ⓒ Pacientes em uso de medicamentos corticoides por um período de até 6 dias.
- Ⓓ Pessoas que devam ser vacinadas contra a COVID que tenham recebido outra vacina do calendário de vacinação há 30 dias.

Questão 39

De acordo com o manual de primeiros socorros publicado pela FIOCRUZ, em algumas pessoas, as picadas por animais peçonhentos como insetos podem resultar em reação ao veneno de caráter sistêmico.

Considerando o tema abordado no texto e aspectos a ele relacionados, assinale a opção correta.

- Ⓐ Não existe tratamento específico de primeiros socorros que seja eficaz no caso de picadas de insetos.
- Ⓑ A vítima pode pegar o animal agressor com a mão, desde que tenha o cuidado para não ser picado novamente.
- Ⓒ Nos acidentes com lagartas, recomenda-se a lavagem na região atingida com água corrente, aplicação de compressas quentes, inclinação do membro acometido e encaminhar para atendimento médico os indivíduos que apresentarem ardor intenso.
- Ⓓ Nos casos de dores intensas devido à picada por animais peçonhentos, deve-se administrar analgésico em casa e observar o local picado por até 6 horas.

Questão 40

A tabela a seguir mostra o resultado de um estudo clínico hipotético com a participação de 1.500 pacientes, dos quais 560 eram pessoas expostas à determinada doença, mas que não a desenvolveram.

		desenvolveram a doença		total
		sim	não	
expostas	sim	240	560	800
	não	140	560	700
total		380	1.120	1.500

Considerando-se os dados da tabela, infere-se que a estatística denominada *risco relativo* (*relative risk*) é igual a

- Ⓐ 1.
- Ⓑ 12/7.
- Ⓒ 24/19.
- Ⓓ 3/2.

Espaço livre