

**-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --****Questão 26**

A circulação que leva o sangue arterial do ventrículo esquerdo para a artéria aorta, da artéria aorta para todo o organismo, distribuindo nutrientes e oxigênio para todas as células, e depois retorna ao átrio direito com o sangue venoso pelas veias cavas superior e inferior, é denominada

- Ⓐ circulação colateral ou circulação bilateral.
- Ⓑ circulação pulmonar ou pequena circulação.
- Ⓒ pequena circulação ou circulação atrial.
- Ⓓ circulação sistêmica ou grande circulação.

**Questão 27**

Considerando os aspectos básicos de farmacologia, assinale a opção correta.

- Ⓐ A farmacocinética estuda apenas o processo de absorção dos fármacos.
- Ⓑ A farmacodinâmica estuda os efeitos farmacológico e colaterais e seu mecanismo de ação.
- Ⓒ A eliminação de fármacos ocorre de forma simples e sem prejuízo ao organismo.
- Ⓓ O efeito farmacológico deve causar o efeito esperado, ou seja, benefício clínico ao paciente, que sempre é alcançado.

**Questão 28**

Considerando as recomendações e precauções atuais relativas ao uso de EPIs para atendimento a pacientes com covid-19 que estejam em quartos privativos, assinale a opção correta.

- Ⓐ Precaução de gotícula é a precaução básica recomendada em caso de atendimento a pacientes com covid-19 e a precaução de aerossóis pode substituí-la em qualquer situação.
- Ⓑ As gotículas com tamanho maior que 5  $\mu\text{m}$  foram excluídas dos padrões de precauções de gotículas.
- Ⓒ Precaução padrão, precaução de contato e precaução de gotícula são as precauções básicas recomendadas em casos de atendimento a pacientes com covid-19 e a precaução de aerossóis pode substituir a precaução de gotículas em situações específicas.
- Ⓓ Somente as precauções padrão e de gotícula são consideradas precauções básicas recomendadas em casos de atendimento a pacientes com covid-19.

**Questão 29**

Ainda com relação a equipamentos de proteção individual (EPIs), essenciais na prevenção de infecções e fundamentais no trabalho da equipe de enfermagem, e considerando as precauções quanto a covid-19, assinale a opção correta.

- Ⓐ A máscara cirúrgica deve ser removida utilizando-se a técnica apropriada, retirando-a cuidadosamente pelas laterais ou pela frente.
- Ⓑ O momento de paramentação para prestar cuidados a pacientes com covid-19 é o de maior risco de contaminação para o profissional de saúde.
- Ⓒ Os óculos de proteção ou protetores faciais devem ser utilizados quando houver risco de exposição do profissional a respingos de sangue, secreções corporais e excreções, sendo que sua limpeza deverá ser feita uma vez ao dia com solução apropriada para a desinfecção do equipamento.
- Ⓓ As luvas de procedimentos não cirúrgicos devem ser utilizadas em qualquer contato com o paciente ou seu entorno.

**Questão 30**

Uma mulher de 62 anos de idade está internada em pós-operatório de colicistectomia. Entre os medicamentos prescritos pela equipe médica está um soro fisiológico de 1000 mL de 12 em 12 horas. Considerando essa situação hipotética, assinale a opção que apresenta o valor do cálculo de gotejamento em gotas por minuto desse soro no equipo de macrogotas.

- Ⓐ 83 gotas por minuto
- Ⓑ 56 gotas por minuto
- Ⓒ 14 gotas por minuto
- Ⓓ 28 gotas por minuto

**Questão 31**

Cuidar de pessoa com demência pode ser complicado, pois sua atenção, memória, linguagem e cognição tendem a se perder progressivamente. Nesse contexto, o cuidador deve

- Ⓐ solicitar sempre a presença de um familiar para acompanhá-lo e ajudá-lo em momentos que requeiram cuidados específicos associados à doença.
- Ⓑ repreender a pessoa com demência para estimulá-la a realizar alguma atividade do dia a dia.
- Ⓒ utilizar frases simples, breves e diretas; caso essa pessoa não colabore, ele deve repetir a instrução usando outras palavras.
- Ⓓ fornecer instruções completas, e não por etapas, e evitar auxiliar a pessoa com demência.

**Questão 32**

Independentemente do tipo de cirurgia, idade do paciente e mesmo do risco cirúrgico, a sala de recuperação pós-anestésica é um local de grande importância para pacientes que estejam se recuperando da fase inicial dos cuidados pós-operatórios em um centro cirúrgico, exigindo muita atenção da equipe de saúde local, especialmente da equipe de enfermagem. Em relação aos cuidados realizados nessa unidade, assinale a opção correta.

- Ⓐ A verificação de sinais vitais deve ser realizada somente na recepção e na alta do paciente da sala de recuperação pós-anestésica.
- Ⓑ Deve-se colher o histórico de complicações pós-operatórias anteriores do paciente.
- Ⓒ Os curativos oclusivos não devem ser manuseados, e sangramentos de pequena e média intensidade devem ser considerados normais no pós-operatório pela equipe de enfermagem.
- Ⓓ A avaliação da dor, da sedação e do conforto, bem como da presença de náuseas ou vômitos, constituem a avaliação na primeira fase do pós-operatório.

**Questão 33**

Acerca da indicação vacinal a crianças, adultos, idosos e gestantes, segundo o Calendário Nacional de Vacinação vigente em 2021, assinale a opção correta.

- Ⓐ A vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) deve ser administrada em duas doses a mulheres de 12 a 49 anos que não tiverem comprovação de vacinação anterior e homens até 39 anos.
- Ⓑ A criança deve receber a vacina da hepatite A no esquema de duas doses até os 15 meses de idade.
- Ⓒ As gestantes devem receber uma dose anual da vacina influenza a partir de 12.<sup>a</sup> semana gestacional.
- Ⓓ A vacina contra pneumococo é aplicada nos indivíduos, com 60 anos ou mais, que convivem em instituições fechadas, tais como casas geriátricas, hospitais, asilos e casas de repouso.

**Questão 34**

Acerca da biossegurança na utilização de EPI na assistência de enfermagem a pacientes com covid-19, assinale a opção correta.

- Ⓐ A indicação para colocação dos EPIs antes da realização de procedimentos não geradores de aerossóis deve seguir a ordem: máscara cirúrgica, avental ou capote, óculos ou protetor facial e luvas.
- Ⓑ No caso de procedimentos geradores de aerossóis, a colocação dos EPIs deve seguir a seguinte ordem: máscara de proteção respiratória, óculos ou protetor facial, gorro ou touca, avental ou capote e luvas.
- Ⓒ A retirada dos EPIs após procedimentos geradores de aerossóis deve seguir a seguinte ordem: luvas, avental ou capote, gorro ou touca, óculos ou protetor facial e máscara de proteção respiratória.
- Ⓓ Recomenda-se a retirada dos EPIs após a realização de procedimentos não geradores de aerossóis conforme a ordem: luvas, óculos ou protetor facial, avental ou capote e máscara cirúrgica.

**Questão 35**

Em situação de parada cardiorrespiratória (PCR), o profissional de saúde pode utilizar um mnemônico para descrever os passos simplificados do atendimento em suporte básico de vida: o C-A-B-D, no qual

- Ⓐ D remete a boa ventilação.
- Ⓑ C remete a compressões torácicas.
- Ⓒ A remete à desfibrilação.
- Ⓓ B remete a abertura das vias aéreas.

**Questão 36**

Muitas pessoas com infecções sexualmente transmissíveis (IST) não buscam tratamento porque são assintomáticas ou têm sinais e sintomas leves e não percebem as alterações. A duração e a transmissibilidade da infecção são maiores quando o acesso ao tratamento é menor. Acerca das IST, assinale a opção correta.

- Ⓐ A imunização para as IST, como HPV, HBV e HAV, está indicada para todas as faixas etárias.
- Ⓑ O HBV é uma doença comumente transmitida por meio de contato oral-fecal, por ingestão de água e(ou) alimentos contaminados.
- Ⓒ No manejo clínico das IST sintomáticas, é indicado oferecer testagem para HIV, sífilis e hepatites B e C.
- Ⓓ A sífilis é uma infecção causada pelo *Treponema pallidum* que pode ser tratada com medicamentos, mas não oferece possibilidade de cura.

**Questão 37**

A dengue é uma doença dinâmica e sistêmica que pode evoluir para remissão dos sintomas, ou pode agravar-se, exigindo constante reavaliação e observação para que as intervenções sejam oportunas e os óbitos não ocorram. Os sinais de alarme devem ser rotineiramente pesquisados e valorizados, bem como os pacientes devem ser orientados a procurar a assistência médica na ocorrência deles. Um sinal de alarme é

- Ⓐ presença de exantema tipo maculopapular em 80% da superfície corporal, acompanhada de diarreia.
- Ⓑ dor abdominal intensa (referida ou à palpação) e contínua.
- Ⓒ febre que tem duração de três dias associada à cefaleia e a dor retro-orbitária.
- Ⓓ queixa de anorexia, náuseas e vômitos.

**Questão 38**

A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) e a síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids) representam um problema de saúde pública. A história natural dessa infecção vem sendo alterada pela terapia antirretroviral (TARV), que resulta em aumento da sobrevivência das pessoas, mediante a reconstituição das funções do sistema imunológico e a redução de doenças secundárias. Acerca de HIV e AIDS, assinale a opção correta.

- Ⓐ O tempo entre a infecção pelo HIV e o aparecimento de sinais e sintomas da fase aguda, denominada síndrome retroviral aguda (SRA), é de 5 semanas.
- Ⓑ A transmissão vertical do HIV pode ser prevenida pela triagem cuidadosa e testagem dos doadores de sêmen e órgãos.
- Ⓒ A pessoa infectada tem a capacidade de transmitir o HIV quando alcança a fase avançada da infecção, na qual há aumento da transmissibilidade do vírus devido à alta carga viral.
- Ⓓ Denomina-se criança exposta ao HIV toda criança nascida de mãe infectada, ou que tenha sido amamentada por mulher infectada pelo HIV.

**Questão 39**

O *Mycobacterium leprae* é um bacilo parasita causador da hanseníase, uma doença infectocontagiosa com manifestações dermatoneurológicas e prevalente em áreas que a população vive em situações de vulnerabilidade socioeconômica, com dificuldades de acesso aos serviços de saúde. A respeito dessa doença, assinale a opção correta.

- Ⓐ A transmissão da hanseníase ocorre pelo contato direto com as lesões de pele de pessoas com hanseníase, sem tratamento.
- Ⓑ A classificação operacional do caso de hanseníase é baseada no número de lesões cutâneas, sendo a paucibacilar (PB) relacionada aos casos com mais de cinco lesões de pele.
- Ⓒ A aplicação da vacina BCG como imunoprofilaxia nos contatos de hanseníase depende da comprovação da história vacinal.
- Ⓓ Devido ao longo período de incubação da doença, de dois a sete anos, ações de prevenção da hanseníase apresentam baixa efetividade.

**Questão 40**

A tuberculose pode acometer uma série de órgãos e(ou) sistemas, sendo a forma pulmonar a mais relevante para a saúde pública, pois é essa forma, especialmente a bacilífera, a responsável pela manutenção da cadeia de transmissão da doença. Acerca da doença tuberculose, assinale a opção correta.

- Ⓐ Define-se como tratamento diretamente observado (TDO) a ingestão diária dos medicamentos antituberculose pelo paciente sob a observação direta de um profissional de saúde ou por familiares.
- Ⓑ A transmissão da tuberculose ocorre pelo contato com gotículas de saliva produzidas por tosse, fala ou espirro de um paciente com tuberculose ativa pulmonar ou laríngea.
- Ⓒ Após sete dias do início do tratamento para tuberculose, o paciente não apresenta risco de transmissão da doença.
- Ⓓ Todo paciente com diagnóstico de tuberculose deve ser testado para HIV.