

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --**Questão 16**

A respeito da assistência de enfermagem em gerontologia, assinale a opção correta.

- Ⓐ A causa mais comum de demência na pessoa idosa é a demência vascular, caracterizada por um início insidioso, o qual se manifesta, geralmente, após um episódio vascular.
- Ⓑ Na pessoa idosa portadora de diabetes, as intervenções dietéticas, com o objetivo de redução de peso, devem ser consideradas após a introdução medicamentosa.
- Ⓒ O enfermeiro deve estar atento às causas de demências reversíveis — por exemplo a neurológica (hidrocefalia), as infecciosas (meningite crônica) e o alcoolismo crônico —, as quais, se tratadas precocemente, podem reverter o quadro demencial.
- Ⓓ A incontinência urinária, incapacidade de controlar a eliminação da urina na bexiga, pode restringir a independência da pessoa idosa, assim como comprometer sua aceitação social e convívio familiar, sendo indicado, nessas situações, o uso constante de fraldas.
- Ⓔ Nos quadros de pseudo-hipertensão — fenômeno comum na pessoa idosa —, poderá ser utilizada a manobra de Osler, que consiste na insuflação do manguito no braço do paciente até o desaparecimento do pulso radial; se a artéria for palpável após esse procedimento, o paciente é considerado Osler negativo.

Questão 17

Assinale a opção correta relativa às práticas assistenciais do enfermeiro e de outros profissionais voltadas para o cuidado, a prevenção, o diagnóstico precoce, a assistência e a reabilitação do indivíduo acometido por câncer em suas diferentes fases da doença.

- Ⓐ As complicações do tratamento quimioterápico incluem a toxicidade hematológica, que consiste na interrupção da produção das células do sangue, as quais são indicadoras iniciais de incremento dos níveis de plaquetas, glóbulos brancos e glóbulos vermelhos e do aparecimento de febre e infecções.
- Ⓑ O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 40 dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário.
- Ⓒ Uma das ações de prevenção primária no controle do câncer, que é considerada efetiva, é a realização de uma abordagem mínima, de cinco a dez minutos nas consultas de rotina de enfermagem, com o objetivo de motivar os pacientes a deixarem de fumar.
- Ⓓ Ações de prevenção secundária no controle do câncer consistem, inicialmente, no rastreamento, para tentar descobrir o mais cedo possível a doença, e, posteriormente, no diagnóstico precoce, centrado na realização de exame em pessoas assintomáticas, o qual serve para classificá-las como passíveis, ou não passíveis, de ter a enfermidade.
- Ⓔ As modalidades terapêuticas para o tratamento do câncer incluem a quimioterapia, a radioterapia e a cirurgia, sendo estas duas últimas classificadas como tratamentos sistêmicos, e a primeira, como tratamento local.

Questão 18

Com base na Política Nacional de Saúde Mental e na assistência de enfermagem ao adulto portador de transtorno mental, assinale a opção correta.

- Ⓐ O acolhimento e a comunicação terapêutica pela equipe de enfermagem devem priorizar a identificação das necessidades assistenciais do paciente e dos seus familiares e a interferência nas relações familiares em defesa do paciente.
- Ⓑ A rede de atenção psicossocial (RAPS) é composta pelos centros de atenção psicossocial (CAPS); pelas unidades de urgência e emergência; pelos serviços residenciais terapêuticos (SRT); pelas unidades de acolhimento (UA); pelos ambulatorios multiprofissionais de saúde mental; pelas comunidades terapêuticas; pelas enfermarias especializadas em hospitais psiquiátricos; e pelos hospitais-dia.
- Ⓒ São alterações da linguagem que podem ser sinais e sintomas indicativos de alguns transtornos mentais a logorreia, que é a fala acelerada e compulsiva; a glossalalia, que é a repetição, como um eco, das últimas palavras proferidas por alguém; e a ecolalia, que é a utilização da linguagem de forma estranha e incorreta, com a criação de termos novos e incompreensíveis.
- Ⓓ O CAPS III, que atende cidades e/ou regiões com pelo menos 70 mil habitantes, oferece atendimento, com até 5 vagas, relativo a acolhimento noturno e observação para todas as faixas etárias bem como transtornos mentais graves e persistentes, inclusive decorrente do uso de substâncias psicoativas.
- Ⓔ O paciente com transtorno de ansiedade generalizada (TAG) permanece em constante estado de irritabilidade, impaciência, e apreensão, geralmente, com queixas de tensão, suores constantes, sensação de “cabeça leve”, tonteiras, mal-estar gastrointestinal, palpitações e dificuldades para dormir.

Questão 19

Sobre a implementação do processo de enfermagem e as taxonomias dos diagnósticos de enfermagem, assinale a opção correta.

- Ⓐ A teoria das necessidades humanas de Maslow estabelece uma divisão hierárquica das necessidades do paciente, as quais são, na seguinte ordem, necessidades fisiológicas, sociais, de segurança, de estima e de autorrealização.
- Ⓑ De acordo com a taxonomia da NANDA I, que apresenta uma estrutura de classificação dos diagnósticos de enfermagem em domínios e classes, o diagnóstico de enfermagem ‘Baixa Autoestima Crônica’ está dentro do domínio 6 (autopercepção), classe 2 (autoestima).
- Ⓒ O esquema e a recomendação para a administração da vacina Influenza a idosos com mais de 60 anos de idade é dose única anual e, em situação epidemiológica de risco, pode ser considerada a administração de uma segunda dose, a partir de 6 meses após a dose anual.
- Ⓓ No processo de enfermagem, que se organiza em etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes, o diagnóstico de enfermagem consiste na realização das ações ou nas intervenções determinadas na etapa de planejamento de enfermagem.
- Ⓔ O modelo de sete eixos da Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE) preconiza a criação das intervenções de enfermagem, utilizando-se, obrigatoriamente, um termo do eixo foco, dois ou mais termos do eixo julgamento, sendo possível a inclusão de termos de outros eixos, exceto do eixo de ação.

Questão 20

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, instituída pela Portaria n.º 2.436/2017, assinale a opção que se refere corretamente aos tipos de equipes que atuam na atenção básica e suas principais características.

- A** Equipe de Saúde da Família (eSF): composição da carga horária mínima por categoria profissional deverá ser de 10 horas, com no máximo de 3 profissionais por categoria, devendo somar, no mínimo, 40 horas/semanais.
- B** Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (EACS): equipe multiprofissional e interdisciplinar composta por categorias de profissionais da saúde e que complementa as equipes que atuam na atenção básica.
- C** Equipe de Atenção Básica (eAB): estratégia prioritária de atenção à saúde, visando à reorganização da atenção básica no país, conforme os preceitos do SUS.
- D** Equipe de Saúde Bucal (eSB): profissionais de saúde bucal são vinculados a uma equipe de atenção básica (eAB) ou a uma equipe de saúde da família (eSF) e que devem compartilhar a gestão e o processo de trabalho da equipe, assumindo responsabilidade sanitária pela mesma população e pelo mesmo território abrangidos pela a equipe de saúde da família ou de atenção básica a qual integra.
- E** Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf – AB): equipe que deve realizar ações previstas nas regulamentações vigentes e assumir responsabilidade por uma microárea cuja população não ultrapasse 750 pessoas.

Questão 21

No que diz respeito às disposições legais da Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS), instituída pela Resolução n.º 588/2018, e a Carteira de Serviços da Atenção Primária à Saúde (CASAPS), assinale a opção correta.

- A** Um dos princípios da PNVS é integrar as práticas e os processos de trabalho das vigilâncias epidemiológica, sanitária, em saúde ambiental e em saúde do trabalhador e da trabalhadora e dos laboratórios de saúde pública.
- B** No que se refere à hipertensão arterial, que é uma doença crônica, multifatorial, classifica-se como hipertenso estágio 2 o indivíduo com pressão arterial sistólica entre 140 mmHg e 159 mmHg e/ou pressão arterial diastólica entre 90 mmHg e 99 mmHg.
- C** A lista de vacinas disponibilizadas para pessoas com 60 anos de idade ou mais inclui, além da vacina anual contra a gripe, a vacina contra hepatite B, febre amarela, herpes zoster, dupla adulto (dT) e pneumocócica 23 valente.
- D** O rastreamento do diabetes melito do tipo 2 (DM2) em indivíduos assintomáticos está indicado em todos os adultos a partir dos 45 anos de idade ou em relação àqueles com sobrepeso, cujo IMC é maior ou igual a 25 Kg/m² e mais um fator de risco para DM2.
- E** O tratamento diretamente observado (TDO), que é uma estratégia recomendada para todas as pessoas com diagnóstico de tuberculose, caracteriza-se pela ingestão diária dos medicamentos antituberculose pelo paciente sob observação direta de um profissional de saúde, amigos ou familiares.

Questão 22

De acordo com a Lei n.º 8.080/1990, o conjunto articulado e contínuo das ações e dos serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema e o processo de articulação entre os serviços que já existem, visando ao comando unificado desses serviços, correspondem, respectivamente, aos princípios

- A** da participação e ao da regionalização.
- B** da integralidade e ao da regionalização.
- C** da igualdade e ao da integralidade.
- D** da equidade e ao da descentralização.
- E** da universalidade e ao da participação popular.

Questão 23

Considerando-se a Portaria n.º 1.820/2009, que dispõe sobre os direitos e os deveres dos usuários da saúde, é correto afirmar que é direito do paciente

- A** ter acesso ao conteúdo do seu prontuário, salvo nos casos de risco à saúde pública, com a presença de um advogado.
- B** receber visita, em casos de internação, de outros profissionais de saúde, desde que estes pertençam ao quadro clínico da instituição, sendo facultado ao profissional o acesso ao prontuário.
- C** usar seu nome de preferência, além de outras formas de identificação, como número, nome ou código da doença.
- D** escolher alternativas de tratamento, quando houver, sendo a válida a recusa de tratamento proposto em situações clínicas graves e críticas.
- E** ter um acompanhante, nos casos de internação, nos casos previstos em lei, assim como naqueles em que a autonomia da pessoa estiver comprometida.

Questão 24

Paciente do sexo masculino, 39 anos de idade, residente em Maringá-PR, sofreu perfuração intestinal com lança de portão de segurança há cerca de quatro meses. No ato cirúrgico, foi realizada a construção de bolsa de colostomia para drenagem fecal. O paciente chega à unidade de internação queixando-se de dor em região abdominal, com presença de edema, dor, calor e rubor em volta da ostomia. Foi evidenciado, no momento da visita de enfermagem, que a bolsa de colostomia apresentava corte maior que o tamanho da ostomia, favorecendo a lesão de pele por conteúdo fecal.

A partir desse contexto clínico, assinale a opção correta, acerca das orientações que devem ser fornecidas ao paciente relacionadas aos cuidados domiciliares.

- A** O paciente deve trocar o sistema da bolsa coletora a cada 30 dias, aproximadamente.
- B** É necessário esvaziar a bolsa coletora quando ela apresenta um enchimento de três quartos de sua capacidade.
- C** A diarreia é uma consistência fecal esperada para o paciente colostomizado.
- D** A coloração do estoma deve se manter entre rosa ou vermelha.
- E** Pacientes com colostomias não apresentam restrições alimentares.

Questão 25

Entre as características do envelhecimento cardiovascular, inclui-se

- A** a diminuição do reflexo de tosse.
- B** a redução dos neurotransmissores.
- C** o aumento do diâmetro anterior-posterior do tórax.
- D** o aumento da rigidez da parede torácica.
- E** a redução da sensibilidade do barorreceptor.

Questão 26

Os pacientes acamados possuem altíssimo risco para o desenvolvimento de lesão por pressão, devido a vários fatores que contribuem para o acometimento dessa disfunção tegumentar. A esse respeito, assinale a opção correta.

- A A prevalência das lesões por pressão é menor nas instalações de cuidados prolongados, enquanto as lesões por pressão adquiridas no hospital são as piores nas unidades de cuidados intensivos de adultos.
- B Uma lesão por pressão é um comprometimento da pele resultante de isquemia prolongada nos tecidos.
- C Uma ulceração é caracterizada inicialmente por inflamação e geralmente não se forma sobre uma proeminência óssea.
- D A isquemia se desenvolve quando a pressão sobre a pele é menor que a pressão interna aos pequenos vasos sanguíneos periféricos.
- E Quanto mais tempo durar a aplicação da pressão, menor será o período de isquemia e, portanto, maior o risco de rompimento da pele.

Questão 27

A lesão do tronco encefálico prejudica o centro respiratório e inibe a frequência respiratória e o ritmo. Na utilização da escala de coma de Glasgow, em avaliação do coma em unidades de terapias intensivas, a resposta

- A espontânea tem pontuação 3 para a ação olhos abertos.
- B à fala tem pontuação 4 para a ação olhos abertos.
- C extensão anormal tem pontuação 2 para a ação melhor resposta motora.
- D orientada tem pontuação 4 para a ação melhor resposta verbal.
- E obediência aos comandos tem pontuação 5 para a ação melhor resposta motora.

Questão 28

A via de administração medicamentosa com menor tempo de ação é a via intravenosa, pois garante que a medicação entre em contato com o tecido alvo e seja metabolizada de forma mais rápida através da condução pela corrente sanguínea. A esse respeito, assinale a opção correta.

- A Não é necessária a salinização de um acesso venoso intermitente após a administração de medicamentos.
- B As vitaminas e o cloreto de potássio são dois tipos de medicamentos comumente adicionados aos líquidos intravenosos.
- C Um *bolus* intravenoso envolve introduzir uma dose diluída de um medicamento diretamente na circulação sistêmica.
- D O *bolus* intravenoso é o método menos perigoso para administrar um medicamento.
- E Infusões de volume controlado dificulta a administração de medicamentos (tal como antibióticos) que são estáveis durante um intervalo limitado de tempo em solução.

Questão 29

Não faz parte da genitália externa feminina

- A os grandes e os pequenos lábios.
- B o colo do útero e a tuba uterina.
- C os pequenos lábios e o orifício uretral.
- D o orifício uretral e os grandes lábios.
- E o clitóris e os pequenos lábios.

Questão 30

A diarreia é uma doença com prevalência na infância. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, não tratar a causa dessa patologia incorre em risco de gravidade iminente à criança, pois pode levar a óbito. O caderno de Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância, publicado pelo Ministério da Saúde, informa que houve 4,5% de óbitos ocasionados por diarreia multicausais no ano de 2020. Acerca desse tema, assinale a opção correta.

- A A diarreia aguda aquosa pode durar até 10 dias; a desnutrição eventualmente pode ocorrer se a alimentação não for fornecida de forma adequada e se acontecerem episódios sucessivos.
- B A diarreia persistente é quando a diarreia aguda se estende por 14 dias ou mais, podendo provocar desnutrição e desidratação.
- C *Shigella* é um dos fungos que pode causar a diarreia em crianças.
- D Sempre é possível identificar o agente causador do episódio diarreico.
- E A investigação da etiologia da diarreia aguda é obrigatória em todos os casos.

Questão 31

Relativamente às fases de crescimento e desenvolvimento da criança e do adolescente, julgue os itens a seguir.

- I O estágio oral dura dos 12 aos 18 meses de idade; inicialmente, a sucção e a satisfação oral não apenas são vitais à vida, mas também extremamente prazerosas por si sós.
- II O estágio anal dura dos 18 meses aos 3 anos de idade, o foco do prazer muda para a região anal. As crianças se tornam cada vez mais conscientes das sensações prazerosas dessa região corporal, havendo interesse pelos produtos de seu esforço.
- III O estágio fático ou edipiano dura dos 3 aos 6 anos de idade. Os órgãos genitais são o foco do prazer durante esse estágio: o menino passa a se interessar pelo pênis; a menina se torna consciente da ausência de pênis, o que é conhecido como inveja do pênis.

Assinale a opção correta.

- A Apenas o item I está certo.
- B Apenas o item III está certo.
- C Apenas os itens I e II estão certos.
- D Apenas os itens II e III estão certos.
- E Todos os itens estão certos.

Questão 32

Maria, paciente do sexo feminino com 63 anos de idade, residente em Londrina-PR, deu entrada na emergência de um hospital em Curitiba. Maria é usuária de *crack* por três anos, consome álcool diariamente e está tentando parar com o uso dessas substâncias. Chegou queixando-se de abstinência, apresentando ansiedade, agitação e tremores nos membros inferiores.

No atendimento à paciente da situação clínica precedente, o enfermeiro deverá

- A promover e ensinar o autoexame de mama.
- B corrigir as desinformações sobre processos de envelhecimento.
- C fazer recomendações escritas com letras grandes e bem espaçadas.
- D encorajar a paciente a deixar de fumar.
- E educar sobre autopreservação, riscos de drogas e de interações droga-fármaco, droga-álcool e droga-alimentos.

Questão 33

Dentre as consequências da pandemia da covid-19, causada pelo vírus SARSCoV-2, as medidas de prevenção e controle de infecção, que ganharam destaque logo no início, precisaram ser atualizadas e ajustadas para a proteção dos profissionais de saúde e da população em geral. Em relação ao uso de equipamentos de proteção individual (EPI) por profissionais da saúde, na prevenção e controle de infecção pela doença em instituições de saúde, assinale a opção correta.

- A Os óculos de proteção ou protetores faciais podem ser compartilhados, quando necessário.
- B As máscaras de proteção respiratória (N95/PFF2 ou equivalente) podem ser utilizadas por período maior ou por um número de vezes maior que o previsto pelo fabricante, independentemente de outras recomendações associadas para o seu uso.
- C Na prestação de assistência ao paciente suspeito ou confirmado de infecção pelo SARS-CoV-2, deverá ser utilizado um avental ou capote simples e de mangas compridas.
- D Há recomendações específicas para a limpeza e desinfecção de superfícies em contato com casos suspeitos ou confirmados pelo SARSCoV-2.
- E As máscaras cirúrgicas têm a finalidade de evitar a contaminação do nariz e da boca do profissional, na situação em que há gotículas respiratórias quando ele está a uma distância inferior a 1 metro do paciente suspeito ou confirmado de infecção pelo SARSCoV-2.

Questão 34

Considerando a atuação da equipe de enfermagem em procedimentos e métodos diagnósticos, assinale a opção correta.

- A O acesso venoso não é obrigatório após a infusão de contraste durante a realização de exames.
- B São atividades privativas do enfermeiro: o preparo do paciente e a administração de medicamentos nos diversos exames contrastados ou não; a orientação do paciente antes e após os exames; o preparo do ambiente e dos materiais a serem utilizados.
- C Conhecer os dados clínicos, como as reações alérgicas, antes de administrar o contraste é fundamental para a equipe de enfermagem, porém, nesse contexto, não é possível reconhecer reações iatrogênicas básicas.
- D A equipe de enfermagem pode atuar em procedimentos e métodos diagnósticos desde que seja treinada e capacitada para a atuação no respectivo setor.
- E Auxiliares e técnicos de enfermagem podem atuar de forma independente e sem a orientação e supervisão dos enfermeiros, de acordo com a legislação em vigor.

Questão 35

Os enfermeiros, assim como todos os outros profissionais da área da saúde que oferecem assistência direta a pacientes nas diferentes unidades de saúde, estão expostos à infecção transmitida por diferentes vias de contaminação. Nesse contexto, a paramentação e a desparamentação realizadas de forma incorreta estão associados à infecção de profissionais. Em relação à paramentação e desparamentação, assinale a opção correta, segundo a recomendação do Conselho Federal de Enfermagem.

- A Na retirada dos equipamentos de proteção individual, é recomendada higienização das mãos com água e sabão ou solução alcoólica apenas após a retirada das luvas.
- B Na paramentação para a realização de procedimentos geradores de aerossóis, é recomendada a seguinte ordem dos equipamentos de proteção individual: máscara cirúrgica, óculos ou protetor facial, gorro ou touca, avental ou capote e luvas.
- C A remoção dos equipamentos de proteção individual deve ser realizada ainda no quarto, próximo à saída, ou na antessala, porém é recomendada a retirada da máscara somente após o profissional deixar o quarto do paciente e fechar a porta.
- D Na retirada do avental ou capote, recomenda-se tocar apenas em sua parte externa para prevenir a infecção.
- E O gorro deve ser retirado somente no final da desparamentação.

Questão 36

Em relação às boas práticas para o processamento de produtos para saúde, assinale a opção correta.

- A O centro de material esterilizado só pode processar produtos compatíveis com a sua capacidade técnica operacional e conforme a sua classificação.
- B Produtos para saúde classificados como críticos devem ser submetidos ao processo de desinfecção de alto nível após a limpeza.
- C Para a esterilização de produtos de saúde, é permitido o uso de estufas.
- D No processo de limpeza manual dos produtos para saúde, a fricção deve ser realizada com acessórios abrasivos para facilitar.
- E As embalagens utilizadas para a desinfecção de produtos para saúde devem estar regularizadas junto à ANVISA, para uso específico nesse processo.

Questão 37

Conforme a Resolução COFEN n.º 564/2017, que regulamenta o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, assinale a opção correta.

- A A equipe de enfermagem tem direito ao acesso às informações sobre pessoa, família e coletividade, necessárias ao exercício profissional.
- B No caso de falta cometida em atividades profissionais em equipe, a responsabilidade será atribuída à equipe.
- C É facultado ao profissional de enfermagem administrar medicamentos sem conhecer os efeitos e riscos destes.
- D Durante a sua permanência no serviço de saúde de uma instituição, o profissional de enfermagem pode delegar algumas funções a acompanhantes ou responsáveis pelo paciente.
- E O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem é válido apenas para enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem.

Questão 38

Assinale a opção que apresenta atividade(s) desenvolvida(s) pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN).

- A disciplinar e fiscalizar o exercício profissional
- B fiscalizar o exercício profissional e decidir os assuntos atinentes à ética profissional, impondo as penalidades cabíveis
- C zelar pelo bom conceito da profissão e dos que a exercem
- D aprovar anualmente as contas e a proposta orçamentária da autarquia, remetendo-as aos órgãos competentes e promover estudos e campanhas para aperfeiçoamento profissional
- E deliberar sobre inscrição no conselho, bem como sobre o seu cancelamento

Questão 39

A respeito dos sistemas de informação na atenção básica, assinale a opção correta.

- A Os recipientes que acondicionam os perfurocortantes devem ser descartados quando o preenchimento atingir $\frac{3}{4}$ de sua capacidade ou o nível de preenchimento ficar a 3 cm de distância da boca do recipiente, sendo proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento.
- B O gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde deve abranger apenas as etapas de planejamento dos recursos físicos e dos recursos materiais.
- C É permitida a separação do conjunto seringa agulha com auxílio de dispositivos de segurança, sendo vedada a desconexão e o reencape manual de agulhas.
- D Resíduos que apresentem risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente podem ser equiparados aos resíduos domiciliares.
- E Os materiais perfurocortantes devem ser descartados em recipientes identificados, rígidos, sem tampa, resistentes a vazamento.

Questão 40

A pesquisa em enfermagem é uma investigação sistemática projetada para desenvolver dados fidedignos sobre problemas importantes para os enfermeiros e seus pacientes. A esse respeito, assinale a opção correta.

- A Na pesquisa quantitativa, os pesquisadores coletam dados quantitativos por meio de descrições narrativas com citações para sustentar suas interpretações.
- B A prática baseada em evidências é o uso da melhor evidência na tomada de decisões no cuidado do paciente e possibilita que o enfermeiro baseie sua prática profissional em dados levantados por pesquisas científicas.
- C A análise estatística permite que os pesquisadores compreendam as informações qualitativas.
- D As estatísticas descritivas, baseadas nas leis de probabilidade, são úteis para resumir dados das pesquisas qualitativas, por meio delas é possível, por exemplo, inferir os resultados sobre a população estudada.
- E Análise fenomenológica é um tipo de análise feita em pesquisa quantitativa.

Espaço livre