

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --

Paciente do sexo masculino, de 16 anos de idade, apresenta lesões em placa eritematodescamativas em área periocular e nas mãos. As lesões são pruriginosas e crônicas. O paciente apresentou na infância lesões semelhantes em dobras cubitais e poplíteas. Seu pai teve o mesmo quadro clínico também na infância.

Com relação ao caso clínico hipotético apresentado, julgue os itens a seguir.

- 51 Trata-se de um eczema seborreico, bastante comum na adolescência e que tende a melhorar espontaneamente.
- 52 Trata-se de uma dermatite atópica, devendo-se pesquisar se o paciente apresenta história clínica de asma ou rinite alérgica.
- 53 O quadro em questão é uma forma clínica comum de eczema na adolescência, em que muitos pacientes apresentam níveis elevados de IgE sérica e sensibilização cutânea a inalantes e alimentos.

Com relação ao lúpus eritematoso neonatal, julgue os itens que se seguem.

- 54 Lesões cutâneas aparecem normalmente em área facial periorbital, podendo ser anulares, e resolvem-se sem cicatrizes atróficas.
- 55 O lúpus eritematoso neonatal resulta da passagem transplacentária de anticorpos principalmente do tipo anti-RO/SSA.
- 56 Nos pacientes acometidos por lúpus eritematoso neonatal, deve-se examinar se existem alterações cardíacas, por ser comum o bloqueio átrio ventricular em um terço desses pacientes.

Com relação à candidíase, julgue os itens a seguir.

- 57 Essa doença é contraída a partir da inalação de esporos e pode gerar quadros sistêmicos graves.
- 58 Os imidazólicos produzem respostas terapêuticas positivas para todas as espécies de cândida.
- 59 A glossite romboide mediana e a queilite angular são manifestações da candidíase.

No que diz respeito à acne rosácea, julgue os itens que se seguem.

- 60 O pico da acne rosácea ocorre comumente em pessoas com idade entre trinta e quarenta anos, principalmente em peles dos tipos I e II.
- 61 A síndrome de Harber é uma genodermatose associada a lesões do tipo rosácea e lesões verrucosas.
- 62 Bebidas quentes, alimentos condimentados, álcool e variações do estado emocional são estímulos desencadeadores comuns dessa condição clínica.

Quanto ao eritema nodoso da hanseníase, julgue os itens subsequentes.

- 63 A talidomina é a principal opção de tratamento do eritema nodoso da hanseníase.
- 64 O eritema nodoso da hanseníase é formado pelo acúmulo de imunocomplexos, o que resulta em vasculite.
- 65 O eritema nodoso da hanseníase é mais comum nas formas paucibacilares.

Acerca do herpes simples, julgue os itens seguintes.

- 66 A erupção recorrente é comum em área orolabial e genital.
- 67 O uso de aciclovir, valaciclovir e famciclovir tem eficácia somente após 48 horas de atividade da doença.
- 68 A infecção ocorre somente na presença de lesões ativas.
- 69 O eczema herpético é uma forma severa que acomete pacientes com psoríase.
- 70 O exame de Tzanck é uma forma de pesquisa do quadro clínico ativo que auxilia no diagnóstico.

Julgue os itens seguintes, a respeito da sífilis.

- 71 A forma secundária da sífilis tem possibilidade de recidiva em 25% dos casos.
- 72 A penicilina benzatina não é mais o medicamento de primeira escolha para o tratamento da sífilis.
- 73 O VDRL é utilizado como forma de monitorar a eficácia terapêutica.

No que se refere à pitiríase liquenoide, julgue os próximos itens.

- 74 A etiologia pitiríase liquenoide é incerta, podendo ser reação de hipersensibilidade a infecções ou drogas, ou doença linfoproliferativa.
- 75 A pitiríase liquenoide não pode ser tratada com fototerapia.
- 76 Na fisiopatologia dessa doença, é comum a existência de eosinófilos.

Com relação à paracoccidioidomicose (PCM), julgue os itens subsequentes.

- 77 O contágio por PCM pode acontecer por meio de solo contaminado.
- 78 Em casos severos de PCM, a anfotericina B pode ser a escolha terapêutica.
- 79 Lesões granulomatosas cutâneas e em mucosas são características em 70% dos casos de PCM.

Acerca do molusco contagioso, julgue os itens seguintes.

- 80 O molusco contagioso é uma doença comum na infância e que pode ser sexualmente transmissível.
- 81 Essa doença afeta, comumente, áreas intertriginosas, dorso, extremidades inferiores e região glútea.
- 82 O contágio por essa doença se dá exclusivamente por contato físico.

Com relação à psoríase, julgue os itens a seguir.

- 83 A psoríase é uma doença cutânea ou articular sem comorbidades cardíacas associadas.
- 84 O uso de imunossupressores deve ser sempre acompanhado de exames clínicos e laboratoriais, para avaliação de efeitos colaterais possíveis.
- 85 No tratamento da psoríase, a fototerapia é eficiente e oferece melhor custo-benefício que os imunobiológicos.

As desordens nutricionais podem acarretar alterações de diversos órgãos e sistemas, e as manifestações cutâneas encontradas nessas desordens podem muitas vezes auxiliar no diagnóstico. A respeito desse assunto, julgue os itens a seguir.

- 86** O escorbuto pode ser encontrado em lactentes que se alimentam exclusivamente do leite materno.
- 87** O marasmo decorre apenas do déficit de carboidratos, enquanto a *kwashiorkor* ocorre pela ingestão proteica deficitária.
- 88** O sinal da bandeira caracteriza-se por cabelos com bandas claras e escuras entremeadas, nas quais as áreas escuras representam o período de pior nutrição na *kwashiorkor*.
- 89** Cerca de 50% a 80% da vitamina A no organismo encontra-se armazenada no fígado e ligada à proteína ligadora de retinol.
- 90** O frinoderma caracteriza-se por hiperqueratose folicular intensa, encontrada na deficiência de vitamina A.

Paciente do sexo masculino, com 44 anos de idade, etilista crônico, foi encaminhado ao ambulatório de dermatologia por apresentar quadro eritematoedematoso pruriginoso associado a bolhas e crostas, simétrico, em áreas fotoexpostas.

Considerando o caso clínico precedente e assuntos a ele relacionados, julgue os itens seguintes.

- 91** Pelagra é uma desordem nutricional causada pela deficiência de vitamina B1.
- 92** A pelagra é conhecida por causar diarreia, dermatite e demência, sendo um sinal característico dessa doença a presença do chamado colar de casal.
- 93** Um quarto da nicotinamida do organismo advém do metabolismo do triptofano; o restante é obtido pela alimentação, a partir do consumo de carne, peixes e ovos, por exemplo.
- 94** Mielinólise pontina central pode ocorrer e até levar à morte súbita, mas os seus sintomas neurológicos tendem a desaparecer em 24 h a 48 h após o início do tratamento com nicotinamida.

Paciente do sexo feminino, com 25 anos de idade, apresenta pápulas e placas amareladas, assintomáticas, há cerca de 5 meses, nas regiões palpebrais.

A respeito desse caso clínico e de aspectos a ele relacionados, julgue os itens a seguir.

- 95** Xantoma estriado palmar sugere hiperlipidemia familiar homozigótica.
- 96** Os diagnósticos diferenciais incluem siringomas, xantogranuloma necrobiótico e xantelasmas.
- 97** O xantelasma é um tipo de xantoma plano e está presente em pacientes normolipêmicos em 25% a 70% dos casos.
- 98** Os xantomias planos possuem sempre caráter benigno, de forma que não é necessário acompanhamento e o tratamento apresenta caráter estético.

Com relação ao câncer de pele, julgue os itens subsequentes.

- 99** O carcinoma basocelular é o tumor maligno cutâneo mais frequente, mas não apresenta risco de metástases.
- 100** O vismodegibe bloqueia a via Hedgehog, sendo indicado em casos de carcinoma basocelular localmente avançado.
- 101** O carcinoma de células de Merkel apresenta alterações cromossômicas que incluem translocações, deleções, e trissomia do cromossoma 2, porém não há registro de mutação no gene p53.
- 102** Em pacientes transplantados, o carcinoma espinocelular é o tumor cutâneo mais comum, sendo aproximadamente duas a três vezes mais comum que o carcinoma basocelular.
- 103** A cirurgia micrográfica de Mohs é considerada a melhor opção terapêutica para o dermatofibrossarcoma *protuberans*.
- 104** A síndrome de Gorlin-Goltz é uma doença causada pela mutação do gene p53 e se caracteriza por múltiplos carcinomas basocelulares, anormalidades esqueléticas, queratocistos odontogênicos e costela bífida.

A respeito de dermatoses parasitárias, julgue os itens subsequentes.

- 105** Em condições ambientais normais, o *Sarcoptes scabiei var hominis* sobrevive por 24 h a 36 h fora do hospedeiro.
- 106** O prurido, principal manifestação da escabiose, inicia-se imediatamente após a infecção.
- 107** A permetrina não deve ser utilizada por gestantes e lactantes.
- 108** O agente etiológico da miíase furunculoide é a *Cochliomya macellaria*.
- 109** O tratamento da larva *migrans* pode ser feito com albendazol 400 mg, em dose única.

Um homem de 55 anos de idade, agricultor, com história de tosse seca e dispnéia aos médios esforços, foi encaminhado à dermatologia por apresentar lesão ulcerada, com granulações finas e pontilhado hemorrágico, no palato.

Considerando esse caso clínico e aspectos relacionados às micoses cutâneas, julgue os itens a seguir.

- 110** No caso apresentado, a cultura do agente etiológico em ágar Sabouraud, em temperatura ambiente, revelará, após 20 a 30 dias, aspecto macroscópico com coloração, a princípio, branca, com halo negro, que progredirá até o total escurecimento da colônia.
- 111** O exame com lâmpada de Wood na pitiríase versicolor revela fluorescência amarelada ou prateada, causada por coproporfirinas, que também estão presentes na cultura do fungo.
- 112** A microscopia da cultura em temperatura ambiente do *Sporothrix schenckii* mostra conídeos ovais ou piriformes dispostos em forma parecida à da flor margarida.
- 113** Na cultura para diagnóstico da doença de Jorge Lobo, observam-se organismos arredondados ou ovalados, com dupla membrana refringente, isolados ou formando cadeias.
- 114** A tinha negra é causada pelo fungo *Hortaea werneckii* e se caracteriza por máculas acastanhadas ou enegrecidas, extremamente pruriginosas.

Os procedimentos cirúrgicos cutâneos podem ser diagnósticos e(ou) terapêuticos e requerem amplo conhecimento da biologia, anatomia e patologia da pele. A respeito desse tema, julgue os itens seguintes.

- 115** A neovascularização com formação de novo complexo vascular nos enxertos ocorre entre o 4.º e o 7.º dia de pós-operatório.
- 116** O tratamento do cisto mixoide requer sempre a remoção cirúrgica.
- 117** A realização de exérese e sutura é uma opção terapêutica indicada no tratamento de verrugas.

A respeito de doenças sexualmente transmissíveis, julgue os itens a seguir.

118 Em relação à história natural da sífilis, 56,4% dos pacientes evoluem sem manifestações ou com cura espontânea.

119 O cancro mole é uma infecção causada pelo bacilo gram-positivo *Haemophilus ducreyi*, e suas úlceras genitais, ao contrário do que ocorre na sífilis, são dolorosas.

120 A gonorreia pode ser assintomática em mulheres, e uma das opções terapêuticas preconizadas pelo Ministério da Saúde é a ciprofloxacina 500 mg, via oral, em dose única.

Espaço livre