-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --

Considerando os procedimentos técnicos de enfermagem validados pelo Ministério da Saúde ou pela ANVISA, julgue os itens a seguir.

51 A fricção antisséptica das mãos com preparação alcoólica substitui a higienização simples das mãos em quaisquer casos.

52 A responsabilidade pelo preparo de soluções parenterais pode ser compartilhada entre enfermeiros, farmacêuticos e técnicos em enfermagem ou em farmácia.

53 O período padrão de inspeção da pele de pacientes sob risco de desenvolvimento de lesões de pele compatíveis com lesões (ou úlceras) por pressão é de uma vez ao dia, podendo ser necessário aumentar essa frequência.

Julgue os itens seguintes, acerca de biossegurança em saúde e controle de infecção hospitalar, de acordo com a legislação de regência.

54 Quaternário de amônio é indicado para antissepsia, mas vedado como saneante.

55 Na classificação da ANVISA dos itens do roteiro de inspeção do programa de controle de infecção hospitalar fixado por essa agência, constam as seguintes classes de itens: item imprescindível; item necessário; item recomendável; e item informativo.

56 A prevenção e o controle de infecções relacionadas à assistência à saúde deverão integrar o foco das estratégias e ações de gestão de risco do Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde (PSP).

57 O grupo de resíduos de serviços de saúde com possível presença de agentes biológicos que, por suas características, podem apresentar risco de infecção é dividido pela ANVISA em sete subgrupos.

58 Está em vigor atualmente o Programa Nacional de Prevenção e Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde, que é plurianual e contém objetivos específicos, metas e indicadores sobre o controle de infecções relacionadas à assistência à saúde.

59 A desinfecção de alto nível é equivalente à esterilização, porque destrói a totalidade dos esporos bacterianos.

Julgue os próximos itens, que dizem respeito à organização do processo de trabalho em saúde e enfermagem.

60 Os requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde fixados por resolução da ANVISA reúnem o que está disposto em todos os normativos necessários ao atendimento de padrões sanitários por estabelecimentos de saúde.

61 Cabe aos profissionais de saúde que prestam o atendimento em serviço de saúde a responsabilidade pelo registro em prontuário.

Julgue os itens que se seguem, relativos a anatomia, fisiologia e histologia humanas.

62 Em nenhuma circunstância, o tecido humano apresenta a propriedade de transformar-se em outro.

63 Na paquimeria, o corpo é dividido em paquímero visceral e paquímero neural.

64 Suturas constituem um tipo de articulação fibrosa encontrada apenas no crânio.

65 Uma das funções do mesentério está relacionada à transdução dos estímulos dos cinco sentidos clássicos: visão, audição, olfato, paladar e tato.

Julgue os itens subsecutivos, referentes a farmacologia, microbiologia e parasitologia.

66 Em um dos ciclos biológicos de transmissão do *Trypanossoma cruzi,* um inseto hematófago é o agente transmissor.

67 Considerada a farmacoterapia para hipertensão, antagonistas adrenérgicos constituem a classe de medicamentos cuja ação é a de bloquear a atividade hormonal associada, sem relação com o estresse.

68 Embora o método Gram tenha surgido como forma de diferenciar bactérias pela coloração, atualmente sua importância reside na resposta diferenciada dessas bactérias a classes de antibióticos.

69 A administração de medicamentos por tubo de gastrostomia (sonda G) é considerada uma administração enteral.

70 No âmbito da farmacologia para enfermagem, estipulam-se, em regra, cinco certos para a administração de medicamentos: paciente certo, medicamento certo, dose certa, profissional certo e horário certo.

Acerca das atribuições do técnico de enfermagem na assistência perioperatória, julgue os itens a seguir.

71 Toda a equipe envolvida no intraoperatório participa do *checklist* de cirurgia segura nas três fases sequenciais: antes da indução anestésica, antes da incisão cirúrgica e antes de o paciente deixar a sala de cirurgia.

72 Cabe ao profissional técnico de enfermagem a condução da aplicação da lista de verificação de cirurgia segura.

73 O *checklist* de cirurgia segura prevê que, antes da indução anestésica, o técnico de enfermagem confirme, verbalmente e por meio do indicador de esterilização, a revisão das condições de esterilização do material disponibilizado para a cirurgia.

74 O técnico de enfermagem é responsável pela organização da sala operatória, bem como pela checagem de aparelhos e insumos necessários para a cirurgia.

75 É função do técnico de enfermagem zelar pela segurança do paciente, atentando para o posicionamento adequado do paciente na mesa cirúrgica e para o manuseio correto da placa de bisturi elétrico.

No que diz respeito à assistência de enfermagem ambulatorial oferecida pelo técnico de enfermagem a pacientes com disfunções cardiovasculares, julgue os itens que se seguem.

76 Em gestantes, a pressão arterial será considerada normal quando os valores coletados na aferição forem iguais ou superiores a 140/90 mmHg.

77 Ao verificar pressão arterial de 170/110 mmHg em paciente adulto, o técnico de enfermagem deve encaminhar imediatamente o paciente para avaliação médica, por se tratar de situação indicativa de crise hipertensiva.

78 Na aferição da pressão arterial em pacientes adultos, se os valores coletados forem menores que 130/85 mmHg, o profissional deve orientar medidas de prevenção primária para hipertensão arterial sistêmica e repetir a aferição em 1 ano.

79 Em pacientes adultos, a pressão arterial será considerada normal quando, na aferição, o valor da pressão arterial sistólica estiver entre 130 e 139 mmHg e o da pressão arterial diastólica, entre 90 e 94 mmHg.

80 No caso de paciente de 17 anos de idade, a pressão arterial será considerada normal se o valor da pressão arterial sistólica for inferior a 130 mmHg e o da pressão arterial diastólica, inferior a 80 mmHg.

No que diz respeito à assistência de enfermagem oferecida pelo técnico de enfermagem, julgue os itens que se seguem.

81 Em pacientes em uso de sonda vesical de demora para tratamento de retenção urinária, recomenda-se que o profissional mantenha a bolsa coletora de diurese ao nível da bexiga em todos os momentos, inclusive durante transporte e procedimentos.

82 Ao assistir um paciente adulto com glicemia de 60 mg/dl, o profissional deve orientar ou ofertar a ingesta de 15 g de carboidrato de absorção rápida, o que equivale a 1 colher de sopa de açúcar ou 150 mL de suco de laranja.

83 Na educação em saúde a pacientes para prevenção de úlcera do pé diabético, orienta-se inspeção diária dos pés e do interior dos calçados, lavagem regular, atenção especial à secagem entre os dedos, corte adequado das unhas e uso constante de calçado.

84 Para realização dos cuidados essenciais relativos a paciente com sonda nasoenteral, o profissional deve realizar a higiene oral do paciente três vezes ao dia e manter a cabeceira de seu leito elevada no mínimo a 30 graus durante a infusão da dieta.

Julgue os itens a seguir, relativos à assistência em saúde mental.

85 Segundo a OMS, a violação de direitos humanos e as desigualdades estruturais são fatores de risco para o adoecimento mental, sendo fundamental que pessoas com condições de saúde mental recebam atendimento humanizado e se sintam valorizadas por suas redes de referência.

86 Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são serviços exclusivos para atendimento às pessoas com transtornos mentais graves e persistentes ou com transtornos mentais decorrentes do uso de *crack*, álcool e outras drogas.

87 Entre os sinais de sofrimento psíquico intenso que demandam intervenção imediata de um profissional de saúde está a expressão pelo paciente de pensamentos sobre tirar a própria vida, planejar o suicídio, ou realizar atos de autolesão, como cortes e queimaduras.

A respeito da assistência de enfermagem em saúde coletiva, julgue os itens subsequentes.

88 Devido ao risco ocupacional cotidiano, os profissionais de enfermagem devem possuir o esquema vacinal completo da hepatite B.

89 Na assistência ao paciente internado com tuberculose pulmonar ou laríngea, é suficiente, para a prevenção da transmissão, que o profissional use máscara cirúrgica durante todo o tempo em que esteja no quarto.

90 Pacientes com suspeita de dengue, sem comorbidades nem condições clínicas especiais, devem ser orientados pelos profissionais de enfermagem a realizar repouso e hidratação oral, não se automedicar e procurar imediatamente o serviço de urgência em caso de sangramento de mucosas.

Em relação à enfermagem materno-infantil, julgue os próximos itens.

91 O método canguru deve ser adotado exclusivamente em ambiente hospitalar, não devendo ser continuado em casa, pois exige conhecimento técnico específico e acompanhamento ambulatorial.

92 O sucesso do tratamento de um recém-nascido internado em UTI neonatal não é determinado apenas pela sua sobrevivência e alta hospitalar, mas também pela construção de vínculos que garantam a continuidade do aleitamento materno e dos cuidados após a alta.

93 Nos recém-nascidos, recomenda-se a avaliação da temperatura retal, pois sua aferição permite avaliação contínua da perda de calor do bebê.

94 A perda de calor em recém-nascidos prematuros é inversamente proporcional às idades gestacional e pós-natal.

No que se refere à assistência de enfermagem ao recém-nascido, à criança e ao adolescente hospitalizado, julgue os itens a seguir.

95 No atendimento de crianças e adolescentes, o profissional deve seguir determinadas regras de abordagem, como solicitar a presença de familiar ou responsável durante o atendimento, usar palavras simples e de fácil compreensão, e repetir as informações quantas vezes forem necessárias.

96 O grau de suspeição de quem presta atendimento à criança pode salvar sua vida, uma vez que maus-tratos geralmente são informados pelos familiares ou cuidadores como "acidentes", sendo necessário que o profissional suspeite da narrativa apresentada.

97 De acordo com as regras de abordagem específicas para atendimento de crianças, o profissional de saúde deve permitir que a criança fique com um objeto de estimação para se sentir mais segura.

98 Na assistência de enfermagem ao recém-nascido, recomenda-se que todos os recém-nascidos recebam 1 mg de vitamina K por via intramuscular após o nascimento, que o primeiro banho seja adiado em até 24 horas após o nascimento e que, se possível, a mãe e o bebê permaneçam no mesmo quarto o tempo todo, não devendo ser separados.

A respeito da assistência em terapia intensiva, julgue os seguintes itens.

99 No âmbito da equipe de enfermagem, são competências privativas do técnico de enfermagem a montagem e a testagem de aparelhos de ventilação mecânica invasiva.

100 O processo de enfermagem na assistência em terapia intensiva compreende cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes, recorrentes e cíclicas: avaliação, diagnóstico, planejamento, implementação e evolução de enfermagem.

101 Na assistência de enfermagem a paciente em terapia intensiva, compete ao técnico de enfermagem a coleta de sangue arterial para fins de monitorização gasométrica e respiratória.

102 Suponha que um paciente pediátrico, de 8 anos de idade, encontre-se internado em unidade de terapia intensiva após insuficiência respiratória aguda e esteja sob ventilação mecânica invasiva. Suponha, ainda, que, durante a assistência, a equipe de enfermagem observe aumento súbito da pressão de pico no ventilador, queda da saturação periférica de oxigênio e presença de secreções traqueais. Nesse caso, a equipe de enfermagem deve aguardar a avaliação médica para realizar qualquer intervenção relacionada ao ventilador mecânico, pois a monitorização dos parâmetros ventilatórios é atribuição exclusiva do médico.

No que concerne à assistência de enfermagem na emergência/urgência e no trauma, julgue os itens a seguir.

103 Considere que uma criança de 7 anos de idade, vítima de colisão automobilística, seja admitida em unidade de emergência, estando consciente, porém agitada, e apresentando frequência respiratória de 34 irpm, saturação periférica de oxigênio de 89% em ar ambiente, tiragem intercostal e presença de sangue na cavidade oral, havendo suspeita de trauma cervical. Considere também que, ao exame inicial, tenha-se observado pulso radial filiforme, extremidades frias e tempo de enchimento capilar de 4 segundos. Nesse caso, conforme a abordagem inicial sistematizada do paciente pediátrico traumatizado e as prioridades da assistência de enfermagem na emergência, a equipe deve iniciar a avaliação pelo controle da circulação, obtendo acesso venoso e administrando solução cristaloide, devendo deixar a abordagem das vias aéreas para momento posterior à estabilização hemodinâmica.

104 A assistência a uma emergência/urgência deve ser iniciada com uma observação rápida do paciente, avaliando-se, entre outros aspectos, sua consciência, seu esforço respiratório, a presença de sons anormais ouvidos sem ausculta (estridor, chiado, gemência) e a coloração da pele (palidez, cianose ou motamento).

105 Ao suspeitar de um episódio de engasgo com tosse e(ou) sinais de sufocação, o profissional deve avaliar a gravidade da obstrução, sendo ela considerada grave quando o paciente apresenta início súbito de grave dificuldade respiratória e(ou) quando ele não consegue tossir ou emitir qualquer som (tosse silenciosa), podendo apresentar o sinal de angústia (sinal universal de asfixia).

Julgue os itens subsequentes, relativos ao diabetes melito (DM) e à hipertensão arterial (HA).

106 Educar os pacientes sobre técnicas de monitoramento domiciliar da pressão arterial e uso de recursos tecnológicos para tal monitoramento contribui tanto para a adesão dos pacientes ao tratamento da HA quanto para a adoção de um estilo de vida saudável, o que favorece um controle eficaz e sustentado da doença.

107 Entre os sinais e sintomas típicos de hiperglicemia incluem-se oligúria, adipsia, polifagia, perda de peso inexplicada e desidratação.

108 Diminuição do peso corporal, redução da ingestão de sódio, aumento da ingestão de potássio dietético (exceto para pacientes com doença renal crônica), dieta saudável, prática de atividade física regular e controle de estresse são algumas das medidas não medicamentosas recomendadas para o tratamento da DM e HA.

109 A associação entre HA e DM torna essencial o controle rigoroso da pressão arterial (PA), sendo a meta PA < 140/70 mmHg a recomendada pela Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial para pacientes com HA e DM.

110 A utilização de equipamento automático de braço para medir a pressão arterial visa reduzir erros e facilitar a obtenção da medida.

Em relação às principais doenças de interesse para a saúde pública, julgue os itens a seguir.

111 Para a prevenção da febre amarela, o SUS adota o esquema vacinal de duas doses durante toda a vida do indivíduo, medida que está em consonância com as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

112 A presença de placas de cor branco-acinzentada nas amígdalas e partes próximas é um dos principais sintomas da difteria, sendo a vacina penta uma das principais estratégias de prevenção da doença.

113 Para o tratamento medicamentoso da hanseníase, é realizada a associação de três antimicrobianos — rifampicina, dapsona e clofazimina —, denominada poliquimioterapia única (PQT-U).

114 A transmissão do vírus do sarampo pode ocorrer entre 6 dias antes e 4 dias após o aparecimento das manchas vermelhas pelo corpo, por meio do contato de pessoa a pessoa, por via aérea, ao tossir, espirrar, falar ou respirar.

115 Para o diagnóstico etiológico das doenças diarreicas agudas (DDA), devem-se coletar as fezes após a administração de antibióticos e outros medicamentos prescritos ao paciente.

116 A cólera é uma doença bacteriana infecciosa intestinal aguda, transmitida por contaminação fecal-oral, que pode ocorrer de forma indireta, pela contaminação por contato pessoa a pessoa, ou de forma direta, pela ingestão de água ou alimentos contaminados.

Julgue os seguintes itens, que dizem respeito às meningites.

117 No apoio e assistência a pessoas afetadas por meningite, devem-se considerar não apenas os sobreviventes, mas também os efeitos suportados em suas redes de apoio.

118 Combater o estigma e a discriminação associados às sequelas da meningite, promover mensagens positivas e advogar pela proteção dos direitos dos indivíduos afetados pela doença constituem ações direcionadas para o acolhimento e a assistência adequados a pacientes e suas famílias.

119 A meningite é uma inflamação das meninges, membranas que envolvem e protegem o cérebro, a medula espinhal e a óssea.

120 A meningite pode deixar sequelas temporárias ou, em alguns casos, incapacidade para toda a vida, sendo a perda auditiva uma das sequelas mais frequentes da meningite viral.