-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --

Em relação a aspectos do gerenciamento de enfermagem em serviços de saúde, julgue os itens a seguir com base na regulamentação e normatização vigentes definidas pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN).

- 51** No cuidado de enfermagem regido pelo processo de enfermagem, a tomada de decisão terapêutica deve ocorrer na etapa de implementação de enfermagem.
- 52** O quantitativo de enfermeiros para o exercício de atividades gerenciais deverá ser dimensionado à parte do quantitativo de profissionais necessários para a execução das ações de enfermagem.
- 53** Um prontuário eletrônico de paciente assinado por enfermeiro por meio de senha de uso coletivo é legalmente válido e dispensa a necessidade de impressão e assinatura física.

De acordo com as disposições da Constituição Federal de 1988 e da legislação básica acerca do Sistema Único de Saúde (SUS), julgue os itens subsequentes.

- 54** O estabelecimento de prioridades no SUS deve ser feito com base na epidemiologia.
- 55** Na organização dos serviços do SUS, deve-se buscar a multiplicidade de meios, mesmo para fins idênticos, em respeito à diretriz da descentralização.
- 56** Ao priorizar a compra e a aplicação de vacinas, o SUS promove uma atividade preventiva e, assim, cumpre uma de suas diretrizes constitucionais.

Acerca da trajetória histórica do SUS, de sua estrutura e de sua organização, julgue os itens que se seguem.

- 57** Hospitais universitários vinculados a instituições de ensino superior públicas constituem organicamente o SUS, independentemente de associação ou convênio.
- 58** São obrigatórias, por lei, adaptações na estrutura e na organização do SUS nas regiões onde residem populações indígenas.
- 59** A Constituição Federal de 1967 já previa o direito à saúde universal e gratuita, mas somente a Constituição Federal de 1988 impôs a criação do SUS para a garantia de tal direito no país.

No que se refere aos serviços de saúde, aos níveis de assistência à saúde, bem como a políticas, ações e programas de saúde estabelecidos pelo Ministério da Saúde no âmbito do SUS, julgue os itens subsequentes.

- 60** Os níveis de atenção à saúde dividem-se em primário, secundário e terciário conforme as densidades tecnológicas singulares empregadas, que são, respectivamente, a de menor densidade, a de densidade intermediária e a de maior densidade.
- 61** O Programa Melhor em Casa, de atenção domiciliar, está vinculado à Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, enquanto a Estratégia Saúde da Família associa-se à Secretaria de Atenção Primária à Saúde.

Julgue os itens subsequentes, acerca de aspectos da assistência em enfermagem de acordo com o previsto pelo Ministério da Saúde.

- 62** As localizações extragenitais de úlceras de donovanose são frequentes, em consequência principalmente da falta de prevenção da autoinoculação.
- 63** Os procedimentos de reanimação de recém-nascido, quando necessários, podem ser realizados com ele fora ou dentro de saco plástico; nesse último caso, seu corpo deve ser previamente secado antes de ser colocado no saco plástico.
- 64** Na avaliação multidimensional rápida da pessoa idosa, deve-se aplicar o cartão de Jaeger apenas se a pessoa referir que tem dificuldade para realizar qualquer atividade da vida diária devido a problemas visuais.
- 65** A dieta do paciente com hepatite A pode ser definida por ele próprio, de acordo com seu apetite, com exceção da ingestão de bebidas alcoólicas.
- 66** A coleta de material para exame citopatológico do colo uterino somente pode ser realizada no SUS por enfermeiro ou médico.
- 67** Adolescentes que, desacompanhados dos pais, buscarem imunização em unidade básica de saúde têm direito a serem atendidos, ainda que sem autorização familiar, com garantia de confidencialidade e sigilo.
- 68** Crises de contraturas em pacientes com tétano acidental podem ser desencadeadas por estímulos luminosos e sonoros, por isso tais pacientes devem ser internados em unidades com mínimo de ruído e de luminosidade.

Tendo como referência o estabelecido pela American Heart Association (AHA) com relação ao suporte básico de vida (SBV) e ao suporte avançado de vida (SAV) em emergência, julgue os itens subsequentes.

- 69** No caso de parada cardiorrespiratória em adulto em que haja uma via aérea avançada, devem-se administrar duas ventilações a cada 6 segundos (20 ventilações por minuto), com compressões torácicas contínuas.
- 70** Na situação de provável ou confirmada parada cardiorrespiratória no ambiente extra-hospitalar, a cadeia de sobrevivência deve ser ACB (abertura de vias aéreas, checagem de responsividade e boa ventilação) ou ACBD (abertura de vias aéreas, checagem de responsividade, boa ventilação e desfibrilação).
- 71** Durante ressuscitação no SAV, o acesso intraósseo é a via de preferência para a administração de medicação, porém, caso ele não funcione adequadamente, torna-se aceitável o acesso intravenoso.
- 72** Para uma ressuscitação cardiopulmonar de qualidade, sem via aérea avançada, a relação compressão-ventilação deve ser de 15:2, associada à alternância dos responsáveis pelas compressões a cada 2 minutos, ou antes, se houver cansaço.

Com relação aos cuidados de enfermagem na administração de medicamentos e soluções, julgue os itens a seguir.

- 73** Como barreira de segurança no processo de administração de medicamentos, o paciente-família ou cuidador deve saber identificar o medicamento que habitualmente esteja sendo administrado, bem como deve ser encorajado a questionar o profissional de saúde, a qualquer momento, caso tenha dúvidas sobre a terapêutica medicamentosa.
- 74** Para atender à necessidade da terapia intravenosa, deve ser selecionado cateter de maior calibre e com cânula de menor comprimento.
- 75** Não deve ser utilizado cateter periférico para infusão contínua de produtos vesicantes, nutrição parenteral com mais de 10% de dextrose ou outros aditivos que resultem em osmolaridade final acima de 900 mOsm/L, ou qualquer solução com osmolaridade acima de 900 mOsm/L.
- 76** A água estéril, ou água para injeção, é uma substância fortemente hipotônica, por isso não é indicada sua administração intravenosa sem adição de medicamentos ou eletrólitos.
- 77** Suponha que tenham sido prescritos 40 mL de glicose 50%, mas, no estoque, só haja ampolas de 10 mL de glicose 25%. Nesse caso, usando-se as ampolas disponíveis, o volume final de glicose 25% a ser administrado é de 120 mL.
- 78** O tempo preconizado de infusão do medicamento ampicilina não pode ser inferior a 1 hora, devido ao risco de ototoxicidade e nefrotoxicidade, relacionadas aos picos do fármaco na corrente sanguínea do paciente.

Acerca de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças transmissíveis e das doenças crônicas não transmissíveis, julgue os itens subsequentes.

- 79** Para a promoção da saúde, a prevenção e o cuidado frente ao câncer, está prevista a realização de campanha nacional sobre os fatores de proteção contra os cânceres mais prevalentes e passíveis de prevenção.
- 80** No eixo da atenção integral à saúde, o fortalecimento do complexo produtivo da saúde para ampliar a produção de insumos farmacêuticos (fármacos) destinados ao enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis é contemplado como estratégia de ação.
- 81** Uma das ações estratégicas para a promoção da saúde é o desenvolvimento de ferramentas digitais para a promoção do autocuidado em pacientes com doenças crônicas, incluindo-se a obesidade, e de hábitos de vida saudáveis, considerando-se a alimentação adequada e saudável e a prática de atividades físicas.
- 82** A garantia da oferta de vacinas para a prevenção da hepatite B, da *influenza* em idosos, do pneumococo e de outras comorbidades das doenças crônicas não transmissíveis está prevista no eixo estratégico da vigilância em saúde.

Com base nos protocolos e nas diretrizes nacionais sobre biossegurança e boas práticas de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, julgue os itens a seguir.

- 83** No gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde que não contenham sangue ou líquidos corpóreos na forma livre nem necessitem de tratamento prévio devem ser acondicionados em saco azul comum e encaminhados para a disposição final ambientalmente adequada.
- 84** A contenção física do perigo associado aos agentes biológicos envolve cuidados com a estrutura física, uso de equipamentos de proteção (individuais e coletivos) e procedimentos para prevenir o contato com agentes de risco bem como a sua disseminação.
- 85** Uma das medidas de controle para a prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes é a adoção de material perfurocortante com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível.
- 86** A contenção primária consiste na proteção do ambiente contra exposição aos agentes de risco.
- 87** Nas precauções para prevenir contaminação por gotículas, as medidas de biossegurança previstas incluem: higienização das mãos antes e depois do contato com o paciente; uso de máscara cirúrgica durante atendimento direto ao paciente; uso de avental e luvas, em caso de riscos de respingos ou contato com secreções; uso de óculos ou protetor de face, em caso de risco de respingos; e uso da máscara cirúrgica pelo paciente durante seu transporte para fora do quarto no ambiente hospitalar.

Com base na legislação que rege o exercício profissional da enfermagem, julgue os itens a seguir.

- 88** As atividades referentes à conservação e à aplicação de vacinas só podem ser executadas pelo técnico de enfermagem ou pelo enfermeiro responsável.
- 89** É garantido aos profissionais de enfermagem o direito a locais de repouso fornecido pelas instituições de saúde, durante todo horário de trabalho e em condições adequadas e específicas.
- 90** São atribuições dos técnicos de enfermagem participar dos programas e das atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco, e participar nos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e de doenças profissionais e do trabalho.
- 91** O piso salarial dos profissionais de enfermagem foi fixado com base no piso estabelecido para o enfermeiro, na razão de 70% para o técnico de enfermagem, 50% para o auxiliar de enfermagem e 30% para a parteira.

Com base no disposto no Código de Ética Profissional dos Profissionais de Enfermagem, julgue os itens que se seguem.

- 92** A gravidade de uma infração ética é caracterizada por meio da análise dos fatos, dos atos praticados ou dos atos omissivos, podendo a análise da infração resultar na cassação do direito ao exercício profissional.
- 93** É dever do enfermeiro posicionar-se contra, assim como denunciar aos órgãos competentes, ações e procedimentos de membros da equipe de saúde, quando houver risco de danos ao paciente decorrentes de imperícia, negligência e imprudência, com vistas à proteção da pessoa, família e coletividade.
- 94** De acordo com o referido código, é dever dos profissionais de enfermagem a comunicação aos órgãos de responsabilização criminal, independentemente de autorização, dos casos de violência contra crianças e adolescentes, idosos e pessoas incapacitadas ou sem condições de firmar consentimento.

A gestão de recursos materiais em saúde objetiva colocar os recursos necessários ao processo produtivo com qualidade, em quantidades adequadas, no tempo correto e ao menor custo. A respeito desse assunto e de aspectos a ele correlatos, julgue os itens subsecutivos.

- 95** Para a prática segura de distribuição de medicamentos, o Ministério da Saúde recomenda aos estabelecimentos de saúde o sistema de dose individualizada.
- 96** Um dos componentes essenciais da gestão de materiais é o controle de estoque: para o setor saúde, recomenda-se estoque zero, devido ao alto custo.
- 97** Com base na previsão e provisão, o enfermeiro deve realizar a rotina de solicitação de materiais, podendo realizá-la, se disponível nos serviços de saúde, por sistemas tecnológicos que facilitem a solicitação de material para consumo interno, interligado em rede com os setores de almoxarifado/compras e farmácia.

No que se refere à sistematização da assistência de enfermagem, julgue os itens seguintes.

- 98** O Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes, recorrentes e cíclicas, na seguinte sequência: histórico de enfermagem; diagnóstico de enfermagem; planejamento de enfermagem; implementação de enfermagem; e avaliação de enfermagem.
- 99** A implementação das intervenções, ações e atividades em enfermagem devem estar apoiadas nos padrões de cuidados de enfermagem, cuidados interprofissionais e cuidados em programas de saúde.
- 100** A documentação do processo de enfermagem deve ser realizada exclusivamente pelo enfermeiro, cabendo-lhe o registro de todas as suas etapas, a anotação de enfermagem e a checagem da prescrição de enfermagem.
- 101** A etapa inicial do processo de enfermagem é denominada avaliação de enfermagem.

Com base na Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS), julgue os itens a seguir.

- 102** Todas as esferas governamentais são responsáveis pela elaboração do perfil epidemiológico utilizado para subsidiar a programação e a avaliação das ações de atenção à saúde.
- 103** A construção da consciência sanitária, mediante a participação da comunidade, é prevista entre os princípios da PNVS.
- 104** As vigilâncias sanitária, epidemiológica e em saúde ambiental são princípios da PNVS.

Julgue os itens que se seguem, acerca da notificação compulsória de casos suspeitos ou confirmados de doenças, agravos ou eventos de saúde pública.

- 105** As investigações dos casos de doenças e agravos relacionados ao trabalho notificados no Sistema de Informação de Agravos e Notificação (SINAN) devem ser encerradas em até 90 dias após sua notificação.
- 106** A Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública deve ser revisada periodicamente conforme o Regulamento Sanitário Internacional.
- 107** Todos os casos de varicela identificados devem ser notificados por meio de ficha de notificação individual.
- 108** Estados e municípios podem adicionar ao Sistema de Informação de Agravos e Notificação (SINAN) problemas de saúde relevantes para a sua região que não estejam na Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública.

No que se refere à vigilância epidemiológica e à vigilância sanitária, julgue os itens subseqüentes.

- 109** A ocorrência de dois ou mais casos de síndrome gripal em ambientes fechados ou restritos caracteriza surto, circunstância em que todos os indivíduos com sintomas devem ser submetidos a teste de COVID-19, bem como devem ser coletadas, pelo menos, duas amostras aleatórias para o teste de *influenza* pelo método RT-PCR em tempo real.
- 110** Eventos supostamente atribuíveis à vacinação ou imunização (ESAVI) é a atual terminologia a ser utilizada para definir qualquer ocorrência médica indesejada após a vacinação, mesmo sem relação comprovada com a vacina ou outros imunobiológicos.
- 111** Na vigilância sentinela da *influenza*, a síndrome gripal é definida pela presença de febre (mesmo que apenas relatada) acompanhada de tosse ou dor de garganta, sintomas esses iniciados nos últimos sete dias.

Em relação à dengue e a demais arboviroses, à febre do Oropouche e às ações de resposta à situação epidemiológica da MPOX em todo o território brasileiro, julgue os itens a seguir.

- 112** A notificação de casos de MPOX para o Ministério da Saúde e para as secretarias estaduais e municipais de saúde deve ser imediata (em até 24 horas).
- 113** O diagnóstico sorológico das arboviroses pode resultar em falsos positivos, em razão da possibilidade de reação cruzada entre arbovírus do mesmo grupo.
- 114** Os casos prováveis de dengue e outras arboviroses correspondem a todos os casos notificados nos sistemas de informação, incluídos os classificados como descartados.
- 115** No manejo clínico da dengue, as gestantes infectadas são automaticamente consideradas no grupo C na classificação inicial.
- 116** A principal estratégia de controle da MPOX é a vacinação, disponível para todas as pessoas com idade entre 18 e 49 anos.
- 117** A vigilância da febre do Oropouche, em regiões não endêmicas, envolve a identificação de casos importados em pessoas com sintomas compatíveis que tenham viajado para estados endêmicos da Amazônia ou que lá residam.

Julgue os próximos itens, acerca da investigação de epidemias.

- 118** Denomina-se caso secundário aquele que ocorre entre os contatos de um caso primário, após 24 horas do surgimento deste.
- 119** O risco relativo representa o risco adicional de doença (ou qualquer outro evento) relacionado à exposição.
- 120** Compete às secretarias municipais de saúde a execução das ações de saúde frente às situações epidemiológicas atípicas que não ultrapassem a capacidade de resposta do município.