-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --

No que se refere ao Sistema Único de Saúde (SUS), julgue os itens a seguir.

51 O usuário do SUS, em caso de risco de morte ou lesão grave, tem direito à remoção, em tempo hábil e em condições seguras, para um serviço de saúde que disponha da capacidade resolutiva adequada ao seu quadro clínico.

52 Ao SUS compete, nos termos da lei, além de outras atribuições, participar do controle e da fiscalização da produção, do transporte, da guarda e da utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.

53 De acordo com a Constituição Federal de 1988, as ações e os serviços públicos de saúde organizam-se em um sistema descentralizado e hierarquizado, com direção única da esfera federal e prioridade para atividades curativas, assegurada a participação da comunidade.

54 A atenção primária à saúde (APS) é considerada o primeiro nível de atenção e tem função resolutiva sobre os problemas mais comuns de saúde dos usuários.

55 Cabe ao sistema estadual de saúde do Pará estabelecer normas, fiscalizar e controlar produtos, substâncias e equipamentos que interfiram na saúde individual, coletiva e do trabalho.

Acerca da vigilância epidemiológica e da vigilância em saúde, julgue os itens que se seguem.

56 Fazem parte da Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública a perda auditiva relacionada ao trabalho, as pneumoconioses relacionadas ao trabalho e os transtornos mentais relacionados ao trabalho.

57 A doença aguda causada pelo vírus *zika* faz parte da Lista de Doenças de Notificação Compulsória Imediata para o Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde e Secretaria Municipal de Saúde.

58 O esquema vacinal recomendado para febre amarela em adultos e idosos é de duas doses iniciais combinadas a doses de reforço a cada dez anos.

59 A transmissão das doenças diarreicas agudas (DDA) ocorre por via fecal-oral na forma direta, por meio de água e alimentos contaminados, sendo a principal forma de prevenção da doença a higienização de frutas e verduras com água potável.

Em relação à Política de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e Servidores do Poder Judiciário, julgue o próximo item.

60 A citada política de saúde é orientada pelos princípios da universalidade e transversalidade de ações, contemplando todos os magistrados e servidores ativos e inativos do Poder Judiciário, bem como seus dependentes.

Julgue os itens subsecutivos, relativos a modalidades assistenciais de saúde.

61 É requisito para a realização do atendimento em regime de hospital-dia-geriatria a presença de estrutura assistencial adequada para que idosos realizem ou complementem tratamentos médicos, terapêuticos, fisioterápicos ou de reabilitação, com os recursos necessários para cumprir os planos terapêuticos.

62 Os serviços residenciais terapêuticos são dispositivos de moradia inseridos na comunidade que funcionam, para pessoas com transtornos mentais, como alternativa à internação em hospitais psiquiátricos e hospitais de custódia, com vistas à reintegração social desses indivíduos.

63 No cuidado de saúde familiar, a caracterização do sistema familiar com o uso do ecomapa permite identificar as relações e ligações dentro do sistema multigeracional da família.

64 Na elaboração do projeto terapêutico singular em assistência domiciliar, a etapa de definição de metas consiste em acordar o que será responsabilidade do paciente e da sua família ou de seus cuidadores na execução dos cuidados.

No que diz respeito ao uso de taxonomias de diagnósticos de enfermagem na assistência de enfermagem, julgue o seguinte item.

65 As taxonomias NANDA-I e CIPE® apresentam abordagens distintas na enfermagem: enquanto a NANDA-I foca principalmente diagnósticos de enfermagem, a CIPE® abrange diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem, oferecendo uma visão mais abrangente do cuidado.

Acerca das unidades de atenção à saúde mental e da assistência de enfermagem em saúde mental, julgue os itens subsequentes.

66 Segundo as boas práticas de comunicação terapêutica, o toque físico não deve ser utilizado como recurso terapêutico, pois interfere na neutralidade profissional e compromete a objetividade do cuidado em saúde mental.

67 As intervenções em saúde mental devem focar na cura das psicopatologias, sendo a remissão dos sintomas considerada o principal indicador de êxito terapêutico.

68 O centro de atenção psicossocial tipo I oferece assistência a adultos com sofrimento psíquico intenso decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, enquanto o centro de atenção psicossocial infantojuvenil é voltado ao atendimento de crianças e adolescentes com transtornos mentais ou problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas.

No que diz respeito à assistência de enfermagem ao recém-nascido, julgue os itens a seguir.

69 O período neonatal corresponde ao intervalo de tempo que se inicia no nascimento e termina no momento em que a criança atinge 29 dias, 23 horas e 59 minutos.

70 Considera-se pré-termo todo recém-nascido com menos de quarenta semanas completas.

71 Frequência cardíaca, esforço respiratório, tono muscular, irritabilidade reflexa e cor são parâmetros de avaliação no primeiro e quinto minutos de vida para o estabelecimento do índice de APGAR.

72 Realiza-se a avaliação do primeiro peso de um recém-nascido logo após o nascimento, sendo considerado baixo peso o inferior a 2.800 g.

73 Conforme os valores de referência de sinais vitais neonatais, considera-se taquipneico o recém-nascido que apresente frequência respiratória maior que 50 mrpm.

Julgue os próximos itens, relativos à assistência de enfermagem aplicada à saúde sexual e reprodutiva da mulher.

74 Em atendimento para planejamento familiar, a equipe multiprofissional deve orientar pessoas em idade fértil, considerando os aspectos biopsicossociais, culturais e transgeracionais relacionados ao livre exercício da sexualidade e à reprodução.

75 As pessoas com fatores de risco reprodutivo recomendam-se métodos contraceptivos mais seguros e efetivos, como DIU, implantes subdérmicos e laqueadura tubária.

76 Para a realização de método de contracepção cirúrgico como a laqueadura durante o período do parto, são necessárias a manifestação de vontade da solicitante até 30 dias antes do parto e a autorização do cônjuge, em caso de sociedade conjugal.

Acerca da assistência à gestante, parturiente ou puérpera, julgue os itens subsequentes.

77 Recomenda-se que a gestante realize, no mínimo, seis consultas de pré-natal, devendo a primeira ocorrer até a décima segunda semana gestacional.

78 O descolamento prematuro de placenta normalmente inserida, uma das principais emergências obstétricas hemorrágicas, tem evolução rápida, podendo resultar em óbitos materno e fetal.

79 O período definido para a estratificação de risco da gestante, com vistas à redução da morbimortalidade materna e infantil por causas evitáveis, é ao final de cada trimestre da gestação.

80 Pré-eclâmpsia sobreposta, edema pulmonar, hemorragia cerebral e insuficiência renal estão entre as complicações maternas associadas à hipertensão arterial crônica durante a gestação.

81 O aleitamento materno exclusivo ocorre quando a criança recebe somente leite materno, provido diretamente da mama ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte, sem outros líquidos ou sólidos, com exceção de suplementos minerais ou medicamentos.

No que diz respeito aos procedimentos técnicos de enfermagem na administração de medicamentos, julgue os itens subsecutivos.

82 Além da adoção dos nove certos na administração de medicamentos, tais como hora, forma, orientação, registro e resposta, é fundamental que o local de preparo de medicamentos permita ao profissional concentrar-se na atividade que está realizando.

83 A reconstituição de medicamentos intravenosos, geralmente realizada em seringas, buretas graduadas ou bolsas de sistema fechado, consiste no acréscimo de diluente ao medicamento em sua forma líquida, com o objetivo de alterar a sua concentração.

84 A manipulação asséptica e as condições de armazenamento de medicamentos são fundamentais para a preservação de sua estabilidade microbiológica.

85 A expansão volumétrica durante a reconstituição de um medicamento não altera a concentração final do produto e não influencia o cálculo das doses.

Julgue os itens que se seguem, acerca do gerenciamento em enfermagem conforme normativos do Ministério da Saúde e do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN).

86 A composição das equipes de enfermagem que prestam cuidados de alta dependência deve atender a proporção de 48% de enfermeiros e 52% de técnicos de enfermagem.

87 O planejamento de enfermagem requer que o plano assistencial desenvolvido seja compartilhado com os sujeitos do cuidado.

88 Com a revogação da portaria do Ministério da Saúde que havia aprovado o Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar, a acreditação hospitalar deixou de ser obrigatória.

Considerando os protocolos de suporte básico de vida do serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU), julgue os próximos itens.

89 Em casos de obstrução leve ou grave em pacientes responsivos, deve-se empregar a manobra de Heimlich.

90 No atendimento a paciente politraumatizado grave com queimaduras, deve-se priorizar o tratamento das queimaduras e de seus efeitos sistêmicos e secundarizar o atendimento aos demais traumas.

91 Todo paciente que apresentar alterações significativas em qualquer etapa da avaliação primária deve ser considerado crítico.

92 Em caso de interrupção da ressuscitação cardiopulmonar em paciente politraumatizado grave com hemorragia externa severa evidenciada e não responsivo ao suporte básico de vida, deve-se orientar os familiares, sempre que possível, acerca dos procedimentos que serão adotados.

93 O parâmetro de abertura ocular na escala de coma de Glasgow apresenta diferentes descrições de sinais para adultos, crianças e bebês.

94 Entre os profissionais de enfermagem, apenas enfermeiros podem executar a avaliação da glicemia capilar no SAMU, ainda que haja técnicos e auxiliares de enfermagem capacitados.

Com base na Política Nacional de Atenção às Urgências e no Regulamento Técnico do Sistema Nacional de Transplantes, ambos implementados mediante portarias do Ministério da Saúde, julgue os seguintes itens.

95 Os quatro componentes fundamentais da atenção integral às urgências são definidos como pré-hospitalar fixo, pré-hospitalar móvel, hospitalar e pós-hospitalar.

96 A Central Nacional de Transplantes adota organização macrorregional, com quatro regiões, para fins de alocação de órgãos; nessa organização, os estados de São Paulo e do Pará encontram-se na mesma região.

A respeito de aspectos ligados à assistência à criança conforme publicações do Ministério da Saúde, julgue os itens subsecutivos.

97 Em crianças com idade de dois meses completos a doze meses incompletos, identifica-se a apresentação de respiração rápida apenas se o número de ciclos respiratórios for igual ou superior a cinquenta por minuto.

98 Entre os potenciais problemas decorrentes da introdução de leite de vaca na alimentação do bebê antes de ele completar doze meses de idade, inclui-se o desenvolvimento de anemia e de alergias.

99 Em caso de abscesso mamário, ainda que somente em uma das mamas, a amamentação deve ser interrompida completamente até o fim do tratamento com antibiótico.

Em relação à atenção à mulher no climatério ou na menopausa de acordo com disposições do Ministério da Saúde, julgue os itens a seguir.

100 O potencial máximo de aquisição de massa óssea antes da chegada da menopausa é alcançado, entre outras medidas, com a realização frequente de exercícios desde a infância.

101 A transição hormonal ovariana do climatério pode simular ou causar sintomas de um hipertireoidismo ainda não diagnosticado.

102 A anamnese da mulher no climatério deve considerar sua orientação sexual como importante informação.

Considerando os pressupostos teóricos e metodológicos da pesquisa em saúde e enfermagem, julgue os itens a seguir, referentes aos fundamentos da mensuração quantitativa.

103 Em estudos de tratamento, as variáveis independentes são aquelas controladas pelos pesquisadores, enquanto as variáveis dependentes são as que podem ser influenciadas pelas variáveis independentes.

104 Nos estudos de causalidade, os investigadores manipulam diretamente as variáveis dependentes para observar se provocam mudanças nas variáveis independentes.

105 Confiabilidade é o grau em que uma medida apresenta o mesmo resultado repetidas vezes sob circunstâncias similares.

Com relação a agravos à saúde relacionados ao trabalho, a risco biológico e medidas de precauções básicas para a segurança individual e coletiva no serviço de assistência à saúde, ao gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde e a práticas de biossegurança aplicadas ao processo de cuidar, julgue os itens subsequentes.

106 Em todo local onde exista possibilidade de exposição a agente biológico deve haver lavatório provido de água corrente, sabonete líquido e toalha descartável, para higienização de mãos, braços, rosto ou outras partes do corpo que possam estar contaminadas.

107 A notificação de acidente de trabalho nos serviços de saúde é compulsória.

108 Até 2/3 da capacidade dos sacos plásticos utilizados no acondicionamento de resíduos de saúde podem ser preenchidos com tais resíduos.

109 A disponibilidade dos equipamentos de proteção individual (EPI) reutilizáveis deve ser baseada na estimativa média de uso pelos profissionais.

110 Os agentes biológicos da classe de risco 4 podem causar ao ser humano doenças graves para as quais não existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento.

111 A vacinação contra hepatite B para pessoas que não são portadoras do vírus causador dessa infecção confere imunidade também contra a hepatite D.

Com base na legislação aplicável à enfermagem, julgue os itens subsequentes.

112 Conforme o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é responsabilidade do enfermeiro prestar assistência de enfermagem em todas as situações de urgência, emergência, epidemia, desastre e catástrofe, sem exceção.

113 Cada paciente em cuidados semi-intensivos deve receber 10 horas de assistência de enfermagem, durante as 24 horas de assistência.

114 É permitido que os locais de descanso dos profissionais de enfermagem sejam utilizados também para alimentação, se eles desejarem.

115 Para o cálculo e planejamento do trabalho de enfermagem, o índice de segurança técnica (IST) deve ser, no mínimo, de 15%, sendo 8,3% para cobertura de profissionais em férias e 6,7% para cobertura de profissionais ausentes por motivos de absenteísmo, treinamento, desenvolvimento, entre outros.

116 Admite-se a autopromoção por profissionais de enfermagem com o objetivo de atrair clientela.

Julgue os itens que se seguem, referentes à central de material e esterilização (CME) e ao processamento de produtos para saúde.

117 Os produtos utilizados na assistência ventilatória devem ser submetidos à desinfecção por métodos de imersão química líquida a base de aldeídos.

118 As leitoras de indicadores biológicos e as seladoras térmicas devem ser calibradas anualmente.

119 A temperatura ambiente da sala de limpeza do CME classe II deve ser mantida entre 18 °C e 22 °C.

120 A concentração e o pH dos artigos semicríticos devem ser conferidos todos os dias ao final das atividades do CME.