

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --

Acerca de taxonomias de diagnósticos de enfermagem, julgue os itens subsecutivos.

- 51** Para o Sistema Único de Saúde, uma característica da Classificação Internacional de Atenção Primária, segunda edição, é a de evidenciar os motivos de procura da pessoa pelo serviço de saúde, mesmo que haja doenças com evidências objetivas fornecidas por quaisquer tipos de exames.
- 52** Na taxonomia NANDA International, em sua versão 2021 – 2023, a classe de diagnósticos denominada Identidade sexual abriga o diagnóstico Disfunção de identidade sexual.
- 53** A taxonomia NANDA International, em sua versão 2021 – 2023, compreende três níveis: domínios, classes e diagnósticos, havendo classes que não possuem sequer um diagnóstico.
- 54** O prontuário eletrônico do cidadão do e-SUS usa o conceito de prontuário orientado por problemas, adotando a Classificação Internacional de Atenção Primária.

Julgue os itens seguintes, acerca dos princípios, das diretrizes, da estrutura e da organização do Sistema Único de Saúde (SUS).

- 55** É permitida a criação de distritos de saúde nos municípios com vistas a organizar o SUS para integrar e articular recursos, práticas e técnicas.
- 56** As competências da direção municipal do SUS incluem a promoção da descentralização dos serviços e das ações de saúde.
- 57** A integralidade da assistência, um princípio do SUS, deve ser entendida sob os pressupostos da articulação e da continuidade das ações e dos serviços correspondentes.
- 58** Em casos excepcionais e justificados, a prioridade para as atividades preventivas referentes ao atendimento integral pode ocorrer em prejuízo dos serviços assistenciais.
- 59** É princípio do SUS a descentralização político-administrativa, por meio da regionalização e da descentralização da rede de serviços de saúde.

Julgue os itens que se seguem, que versam sobre estrutura e funcionamento institucional no contexto dos serviços de saúde e do Sistema Único de Saúde (SUS).

- 60** A Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa estabeleceu como atribuição e(ou) responsabilidade dos gestores estaduais, municipais e do Distrito Federal a implementação de ouvidorias do SUS em suas respectivas esferas administrativas.
- 61** O Mapa da Saúde, como definido por decreto que regulamenta a Lei n.º 8.080/1990, descreve não somente a distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS, mas também daqueles ofertados pela iniciativa privada.
- 62** O processo de planejamento da saúde deve ser descendente, a partir das decisões e diretrizes nacionais, como as emanadas das Conferências Nacionais de Saúde.
- 63** Os serviços especiais de acesso aberto pertencem à atenção terciária e, portanto, não constituem porta de entrada do SUS.

Acerca de políticas e diretrizes de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), julgue os itens subsequentes.

- 64** A Política Nacional de Atenção Integral em Genética Clínica busca atuar sobre os principais problemas de saúde relacionados às anomalias congênitas e às doenças geneticamente determinadas.
- 65** A Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos é uma das poucas políticas de saúde do SUS instituída por Lei, ou seja, discutida e aprovada pelo Congresso Nacional.
- 66** A Política Nacional de Cuidados Paliativos estabelece como princípio a vedação à aceleração da morte, devendo-se, em seu lugar, permitir a evolução natural da doença.
- 67** O Ministério da Saúde publicou recentemente a Política Nacional de Assistência à Saúde em Pequenos Municípios, voltada a municípios de até 10 mil habitantes.
- 68** As Diretrizes Nacionais para Prevenção do Suicídio preveem a articulação dos participantes do SUS em busca de impedir que a estrutura do SUS seja utilizada por pessoas que, submetidas a cuidados paliativos, queiram viabilizar a aceleração de suas mortes.

Considerando as medidas de prevenção para a redução das infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) e os procedimentos técnicos de enfermagem, julgue os itens a seguir.

- 69** Como medida de controle pré-operatório para a prevenção de infecção cirúrgica, nos casos que houver previsão de intubação orotraqueal, é recomendado realizar higiene oral com clorexidina 0,12%.
- 70** Constituem cuidados para a prevenção de ICSRC avaliar a permeabilidade e a funcionalidade do cateter utilizando seringas de diâmetro de 10 mL para gerar baixa pressão no lúmen do cateter, imediatamente após cada uso, com técnica da pressão positiva e *flushing* pulsátil.
- 71** Os cinco momentos de higienização das mãos são os seguintes: antes de tocar o paciente; antes de realizar procedimento limpo/asséptico; após risco de exposição a fluidos corporais; após tocar o paciente; e após tocar superfícies próximas ao paciente.
- 72** São medidas para a prevenção de infecção do trato urinário associada a cateter (ITU-AC) a técnica asséptica para inserção do cateter urinário; o esvaziamento da bolsa coletora regularmente, com recipiente coletor individual e evitando o contato do tubo de drenagem com o recipiente coletor; e a manutenção da bolsa coletora sempre no nível da bexiga.
- 73** Qualquer cobertura para cateter periférico deve ser estéril, podendo ser semioclusiva (gaze e fita adesiva estéril) ou membrana transparente semipermeável.
- 74** Para o curativo de sistemas de drenos abertos, deve-se limpar a incisão do dreno, o dreno e as regiões laterais da incisão do dreno, nesta ordem, com clorexidina alcoólica 0,5%.

No que se refere à assistência de enfermagem aos pacientes com alterações nos sistemas orgânicos, julgue os itens a seguir.

- 75** Em casos de hipercalemia, os níveis de cálcio no sangue estão excessivamente altos.
- 76** Indivíduos acometidos por insuficiência cardíaca congestiva podem apresentar dispneia durante atividades físicas, ou mesmo em repouso, fadiga e fraqueza, edema nas pernas e tornozelos bilaterais e em abdome e tosse persistente.
- 77** Para a verificação da pressão arterial, deve-se selecionar o manguito de acordo com o tamanho do braço (a largura da bolsa inflável deve corresponder a 37 – 50% da circunferência braquial, e seu comprimento envolver pelo menos 75 – 100% do braço) e não se deve colocá-lo sobre roupas.
- 78** O acidente vascular cerebral isquêmico ocorre pela ruptura espontânea (não traumática) de um vaso, com extravasamento de sangue para o interior do cérebro (hemorragia intracerebral), para o sistema ventricular (hemorragia intraventricular) e(ou) para o espaço subaracnóideo (hemorragia subaracnoide).
- 79** Os principais sinais de alerta para qualquer tipo de acidente vascular cerebral são fraqueza ou formigamento na face, no braço ou na perna; confusão mental; alteração da fala ou compreensão; alteração do equilíbrio; alteração na visão; e dor de cabeça súbita, intensa, sem causa aparente.
- 80** Para o tratamento do diabetes melito tipo 2 podem ser utilizados os agonistas do receptor do GLP-1, como a Semaglutida injetável, sendo a aplicação recomendada, nesse caso, uma vez ao dia.

Considerando a assistência de enfermagem ao adulto portador de transtorno mental, julgue os próximos itens.

- 81** As intervenções reducionistas, focadas apenas na droga e na dependência química e tendo a abstinência como único resultado, são efetivas do ponto de vista terapêutico.
- 82** É direito das pessoas que possuem qualquer tipo de transtorno ou adoecimento mental receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento, com linguagem clara, empática e simples.
- 83** O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) II atende pessoas de todas as faixas etárias e é indicado para municípios com população acima de 20 mil habitantes.
- 84** Atendimento em grupos para psicoterapia e atividades de suporte social, oficinas terapêuticas executadas por profissional de nível universitário ou de nível médio, visitas e atendimentos domiciliares e atendimento à família, individual e em grupo são intervenções previstas no CAPS AD IV.
- 85** Os neurolépticos podem ser de alta, média e baixa potência: os de alta potência, como, por exemplo, haloperidol, causam menos efeitos motores (impregnação).
- 86** A educação em saúde abrange intervenções que possibilitem uma resposta social organizada aos problemas e às necessidades de saúde mental, por meio de atividades educativas que envolvam equipes e usuários/famíliares/comunidade e ocorram em diferentes equipamentos sociais.

Em relação ao atendimento a pacientes em situações de urgência e emergência, julgue os itens a seguir.

- 87** O acesso intraósseo é recomendado como acesso de primeira escolha para administração de medicamento em um atendimento a pessoa em parada cardiorrespiratória.
- 88** O serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU) oferece atendimento pré-hospitalar que pode evitar o agravamento do estado da vítima, minimizar seu sofrimento e prevenir sequelas.
- 89** Segundo as diretrizes de 2020 da American Heart Association (AHA), a cadeia de sobrevivência para pessoas adultas em parada cardiorrespiratória no atendimento extra-hospitalar constitui-se destes procedimentos em sequência: 1 - reconhecimento e prevenção precoces; 2 - acionamento do serviço médico de emergência; 3 - reanimação cardiopulmonar de alta qualidade; 4 - desfibrilação; 5 - cuidados após a parada cardiorrespiratória; e 6 - recuperação.
- 90** No atendimento a mulher gestante em parada cardiorrespiratória, o monitoramento do feto deve ser ignorado.
- 91** A monitorização da pressão arterial, quando possível, pode ser um parâmetro fisiológico importante para se avaliar a qualidade da ressuscitação cardiopulmonar.

A respeito da administração de medicamentos e soluções e dos cuidados em enfermagem, julgue os itens que se seguem.

- 92** Para aplicação de medicamentos por via intramuscular, independentemente da faixa etária do paciente, é indicada a região ventroglútea, por ser livre de estruturas anatômicas importantes.
- 93** Para a infusão intravenosa de, por exemplo, 500 mL de soro fisiológico 0,9%, caso não haja bomba de infusão para cálculo de gotejamento, é necessário que o profissional de enfermagem calcule o gotejamento em gotas ou microgotas, a fim de que a infusão do volume aconteça no tempo previsto. Nesse caso, o número de gotas é calculado pela divisão do volume total da solução, em mL, pelo tempo, em horas.
- 94** Segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é proibido aos profissionais de enfermagem administrar medicamentos sem conhecer indicação, ação da droga, via de administração e potenciais riscos, respeitados os graus de formação do profissional.
- 95** Segundo o Ministério da Saúde, seguir os “nove certos” na administração de medicamentos é uma das práticas seguras para a prevenção de erros na administração de medicamentos.
- 96** A ambiência e a comunicação são fatores que não interferem na administração de medicamentos em uma unidade de saúde.
- 97** Ao contrário do que ocorre na administração de medicamentos pela via oral, a via sublingual proporciona uma absorção lenta do medicamento.

Acerca de agravos à saúde relacionados ao trabalho e do gerenciamento de recursos humanos em enfermagem, julgue os itens subsequentes.

- 98** A formação do enfermeiro ainda é majoritariamente baseada em competências técnico-científicas, essenciais para a enfermagem, porém também são necessárias ao profissional as competências ético-políticas e socioeducativas, pois elas estão relacionadas com o espaço ocupado e as relações entre os profissionais.
- 99** Consiste em transtorno mental relacionado ao trabalho todo caso de sofrimento emocional que possa indicar o desenvolvimento ou agravamento de transtornos mentais que tenham como elementos causais fatores de risco relacionados ao trabalho, sejam eles resultantes da sua organização e gestão ou da exposição a determinados agentes tóxicos.
- 100** A Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (LDRT) destina-se, no âmbito da saúde, entre outras finalidades, a orientar as ações de vigilância e promoção da saúde em nível individual e coletivo.
- 101** Lesões por esforços repetitivos (LER) e distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT) são todas as doenças, lesões e síndromes que afetam o sistema musculoesquelético, causadas, mantidas ou agravadas pelo trabalho.
- 102** Ocorre intoxicação exógena quando o indivíduo, depois de exposto a substâncias químicas, manifesta sinais e sintomas clínicos de intoxicação e(ou) alterações laboratoriais possivelmente compatíveis com o quadro de intoxicação.
- 103** Normalmente, lesões por esforços repetitivos (LER) e distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT) caracterizam-se pela ocorrência de um conjunto específico de sintomas concomitantes que aparecem repentinamente.

Com base na legislação pertinente ao exercício da enfermagem e aos seus profissionais, julgue os itens subsequentes.

- 104** O técnico de enfermagem exerce atividades de nível médio, de natureza repetitiva, que envolvem serviços auxiliares de enfermagem sob supervisão, bem como participa, em nível de execução simples, em processos de tratamento.
- 105** A prevenção e o controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela durante a assistência de enfermagem são de competência privativa do enfermeiro.
- 106** Recentemente, passou a ser obrigatória a garantia de condições adequadas de repouso aos profissionais de enfermagem, considerando-se o conforto técnico e acústico.
- 107** O piso salarial dos profissionais de enfermagem deve ser reajustado anualmente com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).
- 108** A prescrição da assistência de enfermagem é uma parte essencial do programa de enfermagem.

De acordo com o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas e Agravos Não Transmissíveis no Brasil (2021 – 2030), julgue os itens a seguir.

- 109** A vigilância em saúde abrange a promoção da saúde, a vigilância epidemiológica de doenças transmissíveis e a vigilância a agravos e doenças não transmissíveis, bem como a vigilância da saúde ambiental e da saúde do trabalhador.
- 110** A criação de medidas regulatórias e fiscais para reduzir o consumo de ultraprocessados e promover o consumo de alimentos *in natura* não deve depender de subsídios técnico-científicos e políticos.
- 111** O eixo de vigilância em saúde propõe o acompanhamento dos indicadores de alimentação e nutrição por meio de sistemas de informação em saúde, pesquisas e levantamentos populacionais.
- 112** A principal meta estabelecida para as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) no referido Plano é a redução, em 10%, da mortalidade prematura (30 a 69 anos de idade) por câncer do aparelho digestivo até 2030.
- 113** O Plano de Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANT) propõe a implantação de um programa nacional de qualidade em mamografia para monitorar e cobrir no mínimo 50% da rede do Sistema Único de Saúde (SUS).

Julgue os itens que se seguem, relativos a educação em saúde.

- 114** A educação em saúde, como atribuição do enfermeiro, implica a promoção ao autocuidado do sujeito, da família e da comunidade.
- 115** Apesar de refletir a realidade cotidiana, o uso das mídias digitais em práticas pedagógicas de saúde pode dificultar a aprendizagem, reduzindo a interação e o aprendizado compartilhado.
- 116** O modelo de educação em saúde dialógica valoriza o saber popular, respeita a autonomia e estimula a participação social no sistema de saúde.
- 117** A educação popular em saúde adota uma abordagem prescritiva, transmitindo normas e conhecimentos por meio de palestras, com o objetivo de mobilizar a comunidade para a melhoria da qualidade de vida.

No que diz respeito às medidas de controle e de tratamento das arboviroses, julgue os itens subsequentes.

- 118** O período de incubação da Chikungunya antecede o início da fase aguda ou febril, que dura até o décimo dia após a contaminação.
- 119** Uma pessoa pode contrair dengue até quatro vezes, pois há quatro sorotipos do vírus dessa doença.
- 120** Os pacientes classificados no grupo D para manejo clínico da dengue na atenção primária à saúde (APS) devem ser encaminhados imediatamente, de ambulância, para a internação, na qual devem permanecer no mínimo 48 horas.