

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --

No que concerne ao exame da cavidade bucal, julgue os itens que se seguem.

- 51** Na mucosa bucal, ulcerações não dolorosas persistentes por mais de quinze dias devem ser devidamente investigadas em relação ao diagnóstico de câncer de boca.
- 52** As petéquias são variações de normalidade da mucosa comumente encontradas durante o exame bucal, especialmente em pacientes idosos.
- 53** A inspeção da cavidade oral é procedimento que consiste na avaliação visual de cor, forma, tamanho, simetria e consistência das regiões anatômicas orais.
- 54** O uso de próteses dentárias mal adaptadas pode levar ao desenvolvimento de lesão reacional do tecido conjuntivo fibroso denominada hiperplasia fibrosa inflamatória.

Julgue os próximos itens, relativos à etiopatogenia da cárie dental.

- 55** O valor do pH crítico do esmalte dentário é em torno de 5,5, mas, na presença de flúor, esse valor é aumentado, o que torna o ambiente bucal mais resistente à cárie dentária.
- 56** Em termos globais, há uma relação entre a melhora no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e a redução da prevalência de cárie dentária.
- 57** A xerostomia não está relacionada ao aumento do risco de cárie dentária.
- 58** Os estreptococos do grupo mutans são cocos gram-positivos e representam bactérias que têm um papel mais importante na progressão do que na instalação da cárie dental.

A respeito de semiologia, tratamento e prevenção da cárie dentária, julgue os itens a seguir.

- 59** O tratamento minimamente invasivo é aquele que não utiliza instrumentos rotatórios para a remoção do tecido cariado.
- 60** A aplicação de selantes dentários para proteger os dentes contra a cárie dental é uma medida preventiva eficaz, principalmente para aqueles pacientes que são considerados de alto risco, como as crianças.
- 61** O uso de selantes dentários promovem a proteção de fissuras e fôssulas, uma vez que os selantes atuam como uma barreira física, impedindo que restos alimentares e bactérias entrem em contato com essas áreas vulneráveis.

Julgue os próximos itens, relativos ao preparo cavitário.

- 62** O preparo cavitário para cerâmica *onlay* dispensa retenção mecânica.
- 63** O objetivo do preparo cavitário não é remover todo o tecido cariado, independentemente do estágio da lesão de cárie.
- 64** O preparo cavitário não é uma abordagem única, e o tipo de material restaurador escolhido influencia diretamente o formato e as características do preparo.

Considerando os materiais forradores e restauradores em odontologia, julgue os itens a seguir.

- 65** As resinas compostas são consideradas materiais restauradores diretos, com pouca durabilidade em restaurações definitivas de dentes posteriores.
- 66** A evolução para a cerâmica de dissilicato de lítio prensada trouxe melhorias significativas em suas propriedades físicas, incluindo a resistência flexural, o que contribuiu para o seu sucesso como material restaurador em odontologia, com melhoria da longevidade clínica.
- 67** Um dos aspectos negativos do cimento de hidróxido de cálcio como material de forramento de preparos cavitários é sua baixa resistência mecânica, o que torna o material vulnerável ao desgaste e à fratura.
- 68** O cimento de ionômero de vidro (CIV) modificado por resina possui algumas vantagens em relação aos CIVs convencionais, como, por exemplo, melhor adesão, resistência, tempo de trabalho e melhor resultado estético.

Em relação aos procedimentos cirúrgicos, julgue os itens que se seguem.

- 69** Como medida de controle do sangramento pós-operatório, nas exodontias, o cirurgião deve colocar pequeno rolete de gaze seca diretamente na região, instruindo o paciente a morder, sem mastigá-la, por 30 minutos.
- 70** Nas exodontias mandibulares dos terceiros molares retidos, pode-se utilizar a incisão tipo envelope com extensão posterior divergente.
- 71** Os retalhos triangulares devem ser utilizados quando há necessidade de abordagem maior no sentido apical.
- 72** Nos terceiros molares inferiores, a angulação é o fator determinante para o direcionamento da secção dental: como segurança de lesão nervosa, a secção no sentido lingual é, em geral, de $\frac{3}{4}$ da distância nesta direção.
- 73** Para os terceiros molares maxilares, a incisão tipo envelope se estende em direção ao tuber distalmente ao segundo molar, com a relaxante na mesial do primeiro molar.

Em relação aos conceitos e aplicações da terapêutica e da farmacologia, julgue os itens subsequentes.

- 74** A penicilina, as cefalosporinas, a azitromicina e a clindamicina são consideradas de uso seguro na prescrição para gestantes.
- 75** Quinolonas como ciprofloxacina, azitromicina e aminoglicosídeos possuem ação principal contra bactérias gram-negativas.
- 76** Na via da cicloxigenase, a COX-2 está presente em pequenas quantidades nos tecidos normais, considerada pró-inflamatória; a COX-1, associada de forma constitutiva tecidual; e a COX-3 ainda está sendo estudada, com forte associação ao SNC.
- 77** A analgesia preemptiva tem início imediatamente após a lesão tecidual, porém antes do início da sensação dolorosa.
- 78** O paracetamol é muito utilizado na odontologia, considerado forte inibidor de COX-1 e COX-2, com ação analgésica potente, porém sem interferência na exacerbação de edema.
- 79** No controle da dor refratária ao uso de analgésicos, pode-se utilizar a analgesia de ação central, como a codeína e o tramadol, considerados opioides fracos, porém sem recomendação pediátrica.

Julgue os itens seguintes, em relação às alterações dos tecidos de proteção e sustentação dos dentes.

- 80** Na avaliação e classificação das condições e deformidades mucogengivais, a recessão gengival é influenciada pelo fenótipo periodontal, que expressa a combinação do biotipo genético gengival e do morfotipo ósseo.
- 81** As fibromatoses gengivais hereditárias e a gengivite na doença de mãos, pés e boca não são induzidas pelo biofilme.
- 82** Perda óssea com progressão direta igual ou superior a 2 mm em 5 anos ou com progressão indireta de perda óssea/ano superior a 1 mm, com a destruição sendo compatível à presença suficiente de biofilme, remete ao diagnóstico de periodontite grau B.

No que se refere às indicações dos implantes, julgue os itens a seguir.

- 83** A escolha por realizar um implante imediato está relacionada ao biotipo gengival e à espessura óssea alveolar, no entanto, a posição vestibulo-lingual do implante não interfere na posterior reabsorção óssea e recessão gengival.
- 84** Na indicação de um implante, deve-se analisar a carga que será transmitida do corpo do implante ao osso, uma das principais causas da reabsorção óssea marginal.

Quanto à interpretação radiográfica na odontologia, julgue os itens subsecutivos.

- 85** A imagem radiopaca formando uma linha oblíqua na região de pré-molares superiores, de alto contraste, e que parece estar coberta por um véu de ligeira radiopacidade, corresponde ao processo hamular.
- 86** A imagem do *loop* anterior deve ser avaliada em extensão e profundidade no planejamento de implantes dos incisivos superiores.

Julgue os próximos itens, relativos à anestesia local em odontologia.

- 87** O uso de anestésicos com prilocaína em doses elevadas não é recomendado em gestantes, pois pode aumentar os níveis de metemoglobina.
- 88** A utilização de anestésicos locais é contraindicada em pacientes com histórico de alergia a sulfonamidas, devido ao potencial de reações cruzadas entre os anestésicos do tipo amida e sulfonamidas.
- 89** A adrenalina se liga diretamente aos receptores beta e alfa dos órgãos inervados pelo sistema nervoso parassimpático e tem como efeito sistêmico o aumento da pressão sistólica e da frequência cardíaca.
- 90** A lidocaína é considerada um dos principais anestésicos para utilização em odontologia e sua popularidade se deve à sua eficácia, segurança, início de ação rápido e perfil de duração que atende à maioria dos procedimentos odontológicos.

Acerca da exodontia, suas indicações, contraindicações, tratamento dos acidentes e complicações, julgue os itens a seguir.

- 91** A avaliação e o monitoramento do Índice Internacional Normalizado (INR) é um fator importante para a realização de exodontias em pacientes que utilizam anticoagulantes orais.
- 92** A alveolite seca é uma complicação resultante do deslocamento ou da formação inadequada do coágulo sanguíneo responsável por proteger o alvéolo após a exodontia.
- 93** Pacientes que passaram por radioterapia na região da cabeça e pescoço apresentam um risco aumentado de complicações como, por exemplo, diminuição da capacidade de cicatrização.
- 94** De acordo com o consenso e as diretrizes atuais, a profilaxia antibiótica é recomendada rotineiramente em pacientes saudáveis para prevenir infecções após a extração dentária.

Com referência aos traumatismos dentoalveolares, diagnóstico e tratamento, julgue os itens que se seguem.

- 95** Em casos de avulsão dentária, a radiografia é desnecessária, uma vez que a ausência do dente na cavidade alveolar é suficiente para confirmar o diagnóstico e o devido manejo clínico.
- 96** A solução salina balanceada de Hanks (HBSS) é recomendada pela Associação Internacional de Traumatologia Dentária como meio de armazenamento para dentes avulsionados.
- 97** Em casos de luxação dentária extrusiva sem fratura, o tratamento ideal consiste no reposicionamento imediato do dente seguido de contenção com resina comporta por um período, em geral, de 6 a 8 semanas.

Com relação às noções de ortodontia e suas indicações, julgue os itens a seguir.

- 98** Relação cêntrica é a relação intermaxilar que representa uma posição fisiológica na qual os conjuntos côndilo-disco estão corretamente alinhados e devidamente assentados em suas respectivas cavidades articulares.
- 99** Nos casos de mordida aberta anterior, o tratamento ortodôntico é suficiente, sem necessidade de cirurgia ortognática.

Com relação aos procedimentos clínicos integrados em periodontia, endodontia, prótese e dentística, julgue os próximos itens.

- 100** As coroas totalmente cerâmicas são indicadas em reabilitações protéticas quando se busca maior estética, especialmente em dentes anteriores, enquanto as coroas metalocerâmicas são indicadas em regiões posteriores devido à maior resistência.
- 101** Lesões endoperiodontais são condições patológicas complexas que envolvem uma interação entre os tecidos pulpare e periodontais; seu surgimento ocorre devido à comunicação anatômica e funcional entre a polpa dentária e o periodonto em, por exemplo, canais acessórios e forame apical.

A respeito das normas de biossegurança, julgue os itens subsequentes.

- 102** Profissionais odontológicos vacinados contra hepatite B devem ser submetidos ao teste de soroconversão anti-HCs, para verificar se estão devidamente imunizados.
- 103** Em determinadas situações, é permitido a reutilização de materiais de barreira de proteção descartáveis, como campos cirúrgicos, desde que sejam desinfetados adequadamente.
- 104** O descarte de resíduos contaminados, como materiais perfurocortantes, deve ser realizado em recipientes específicos, rígidos, resistentes à perfuração e devidamente identificados.

Acerca de odontopediatria, odontologia estética e polpa dental, julgue os itens subsequentes.

- 105** A inervação da polpa é feita por fibras amielínicas e mielínicas; na zona odontogênica, encontram-se as fibras denominadas delta A (2 a 5 μ m), que são amielínicas, termorreceptoras para o frio, possuem condução rápida do estímulo, tendo baixo limiar de excitação e não estando relacionadas ao dano tecidual.
- 106** A fibromatose gengival química ou medicamentosa está associada ao uso de alguns medicamentos de uso contínuo, em especial, a fenitoína (anticonvulsivo), a ciclosporina (imunossupressor) e o nifedipino (bloqueador de canais de cálcio).
- 107** A doença das mãos, pés e boca, geralmente causada pelo vírus Coxsackie, pode surgir em qualquer idade, mas a maioria dos casos ocorre em bebês ou crianças, sendo o quadro clínico estabelecido pela presença de lesões na pele e na mucosa oral, com as lesões orais e das mãos quase sempre presentes — na boca, as lesões se manifestam com a presença de 1 a 30 máculas eritematosas, que se desenvolvem com aparecimento das vesículas que vão sofrer ruptura e resultar no aparecimento de úlceras, de tamanhos variáveis e que cicatrizam em um prazo de uma semana.
- 108** Indivíduos que possuem face longa e estreita e arcadas dentárias relativamente estreitas são classificados como dolicocefalos, ou seja, nesses indivíduos há o predomínio da altura facial em relação à profundidade e largura.
- 109** A polpa possui pressão tecidual de cerca de 10 mmHg e os fluidos produzidos pela polpa migram pelos túbulos dentinários, podendo atingir até a junção amelodentinária: em situações patológicas, esse deslocamento do líquido, assim como o aumento da pressão intrapulpar, está associado ao estímulo doloroso.
- 110** Entre as várias linhas e ângulos utilizados para avaliar a estética facial do tecido mole inclui-se a linha de Holdaway, o plano estético de Ricketts e a análise do tecido mole de Burstone, sendo a linha de Holdaway determinada pela união de um ponto do mento (pogônio mole) e do ponto mais proeminente do lábio superior.

Julgue os itens que se seguem, relativos a odontologia preventiva e saúde pública.

- 111** A análise microbiológica de dentes selados tem demonstrado que, enquanto o selante permanecer intacto, os microrganismos têm grande dificuldade de sobrevivência, podendo-se observar diminuição da microbiota viável e mudanças na textura da dentina após o selamento com compostos à base de BISGMA.
- 112** O exame clínico visual vem sendo apontado como o principal método na detecção de lesões de cárie, devendo qualquer outro método ser de caráter complementar a ele.

Julgue o próximo item, a respeito de prótese bucomaxilofacial.

- 113** A maxilectomia nem sempre acarreta deficiência de funcionalidade na cavidade bucal, seja ela parcial ou total.

Com relação à odontogeriatría, julgue os itens subsequentes.

- 114** Com o processo de envelhecimento, há diminuição da acuidade visual e envelhecimento do sistema vestibular, o que pode interferir no controle motor para a execução de tarefas funcionais básicas e de autocuidado.
- 115** A menor produção de saliva, no caso dos idosos, assume uma grande importância no aumento da suscetibilidade ao uso de medicamentos e a doenças que levam a xerostomia, entre elas o linfoma de Hodgkins e a granulomatose de Wegener.
- 116** A profilaxia antibiótica não é indicada em casos de defeito cardíaco congênito que tenha sido completamente reparado com material protético durante os primeiros 6 meses após o procedimento de reparo.

Sobre ética profissional na odontologia, julgue os itens a seguir.

- 117** O cirurgião-dentista deve evitar o aviltamento ou submeter-se a tal situação, inclusive por parte de convênios e credenciamentos, pela fixação de valores dos serviços profissionais de forma irrisória ou inferior aos valores referenciais para procedimentos odontológicos.
- 118** Os profissionais da odontologia deverão manter no prontuário os dados clínicos necessários para a boa condução do caso, devendo esse prontuário ser preenchido, em cada avaliação, em ordem cronológica com data, hora, nome, assinatura e número de registro do cirurgião-dentista no Conselho Regional de Odontologia.
- 119** O profissional inscrito poderá utilizar-se de meios de comunicação para conceder entrevistas ou palestras públicas sobre assuntos odontológicos de sua atribuição, com finalidade de esclarecimento e educação no interesse da coletividade, desde que não haja autopromoção ou sensacionalismo e se preserve sempre o decoro da profissão, sendo vedado anunciar nesse ato o seu endereço profissional, endereço eletrônico e telefone.

Julgue o item subsequente, no que se refere a auditoria e perícia odontológica.

- 120** Por serem os conselhos regionais de odontologia, autarquias ou entidades públicas, o Estado lhes concede dois poderes: autoexecutoriedade, que se refere à autoridade para impor a lei e seu cumprimento, e a coercibilidade, que se refere à autonomia administrativa.