

- Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, os espaços para rascunho indicados no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto para a **FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA**, nos locais apropriados, pois **não será avaliado fragmento de texto escrito em local indevido**.
- Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
- Na **Folha de Texto Definitivo**, a presença de qualquer marca identificadora nos espaços destinados à transcrição do texto definitivo acarretará a anulação da sua prova discursiva.
- Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até **30,00 pontos**, dos quais até **1,50 ponto** será atribuído ao quesito apresentação (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto estruturado).

-- PROVA DISCURSIVA --

Maria, 48 anos de idade, oficial de justiça, compareceu ao serviço médico do Tribunal queixando-se de forte dor de cabeça de início súbito havia cerca de 1 hora, acompanhada de náuseas e visão turva. Maria informou ser portadora de hipertensão arterial havia 5 anos, em uso irregular de hidroclorotiazida 25 mg. Relatou fazer acompanhamento médico esporádico e não se recordar da última vez que havia aferido a pressão arterial. Ao exame físico, a médica responsável pelo atendimento observou que a Maria estava visivelmente agitada e ansiosa, apresentando-se com fácies de dor e sudorese. Sua pressão arterial estava significativamente elevada, com valores de 210 mmHg × 130 mmHg em ambos os braços. A frequência cardíaca era de 110 bpm e o ritmo cardíaco era regular. A ausculta pulmonar não apresentava alterações. O exame neurológico sumário não evidenciou déficits focais, porém a paciente queixava-se de dificuldade para enxergar nitidamente.

Com base no caso clínico hipotético apresentado, referente a uma situação de crise hipertensiva no ambiente de trabalho do Tribunal, redija um texto dissertativo acerca da conduta médica adequada ao caso. Em seu texto, aborde os seguintes aspectos:

- 1 classificação da crise hipertensiva, com a devida justificativa; [valor: 7,50 pontos]
- 2 pelo menos três dos principais diagnósticos diferenciais a serem considerados; [valor: 8,00 pontos]
- 3 ambiente adequado para o tratamento da paciente; [valor: 5,00 pontos]
- 4 tratamento(s) recomendado(s), indicando se não medicamentoso ou medicamentoso e incluindo nome e via do medicamento se for o caso. [valor: 8,00 pontos]

RASCUNHO – 1/2

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

RASCUNHO – 2/2

31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	