


-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --**▼ Questão 21**

Observe a célula apresentada na figura a seguir.



Nessa figura, as organelas e as estruturas da célula identificadas pelos números de 1 a 4 são, respectivamente,

- A** microtúbulos; membrana celular; retículo endoplasmático agranular; complexo de Golgi.
- B** microfilamentos; citoplasma; lisossomo; mitocôndria.
- C** centríolos; membrana celular; complexo de Golgi; retículo endoplasmático liso.
- D** centríolos; membrana celular; retículo endoplasmático granular; retículo endoplasmático agranular.
- E** lisossomos; núcleo; mitocôndria; complexo de Golgi.

▼ Questão 22

Em relação à anatomia e à fisiologia do sistema cardiovascular, assinale a opção correta.

- A** Os linfócitos entram de forma contínua no sistema circulatório, junto com a drenagem da linfa dos linfonodos e de outros tecidos linfóides e, depois de algumas horas, passam do sangue de volta para os tecidos por quimiotaxia.
- B** As artérias têm a função de transportar sangue sob baixa pressão para os tecidos e, por esse motivo, têm paredes vasculares finas e nelas o sangue flui em baixa velocidade.
- C** As veias funcionam como condutos para o transporte de sangue das vênulas de volta ao coração e, como a pressão no sistema venoso é muito alta, as paredes das veias são fortes e suficientemente musculares para contrair-se e expandir-se, de acordo com as necessidades da circulação.
- D** A principal função das hemácias, também conhecidas como eritrócitos, consiste no transporte de hemoglobina, que, por sua vez, leva oxigênio dos pulmões para os tecidos.
- E** A hipóxia resultante do transporte diminuído de oxigênio pelo sangue faz que os vasos sanguíneos dos tecidos periféricos contraiam-se, permitindo a diminuição do retorno de sangue para o coração, o que diminui também o débito cardíaco para níveis ainda mais altos.

▼ Questão 23

Sobre a ascariíase, assinale a opção correta.

- A** O *Ascaris lumbricoides*, também conhecido como lombriga ou bicha, tem como hospedeiro intermediário os caramujos do gênero *Biomphalaria*.
- B** A principal manifestação clínica da geo-helminíase é o prurido perianal, frequentemente noturno, que causa irritabilidade, desassossego, desconforto e sono intranquilo.
- C** A ascariíase é uma geo-helminíase que faz parte do Plano Integrado de Ações Estratégicas de Doenças em Eliminação, o que exige a notificação compulsória nacional.
- D** O tratamento de primeira escolha para a ascariíase, o qual deve ser realizado por profissionais de saúde capacitados, é o praziquantel, de uso oral, de amplo espectro e baixo custo, durante 21 dias, associado à dexametasona.
- E** A migração de grandes quantidades de larvas da ascariíase para o fígado e para os pulmões pode ocasionar desconforto na região hepática, ânsia de vômito, febre e tosse, podendo desencadear um quadro de pneumonia verminótica.

▼ Questão 24

Com relação à terapia medicamentosa, assinale a opção correta.

- A** Os locais de ação, na farmacocinética, são os alvos das substâncias endógenas, que são produzidas pelo organismo, ou exógenas, que é o caso dos medicamentos, quando da interação para produzir uma resposta farmacológica.
- B** O caminho percorrido pelo fármaco no organismo se dá na seguinte ordem: distribuição, absorção, biodisponibilidade, biotransformação e excreção.
- C** Os antiácidos têm a capacidade de diminuir a absorção dos anti-inflamatórios e, conseqüentemente, reduzir seu efeito terapêutico, fenômeno que, na farmacologia, é denominado de incompatibilidade medicamentosa.
- D** A excreção renal de fármacos é a mais comum, mas depende da natureza hidrofílica dos fármacos, os quais podem ser filtrados no glomérulo renal, secretados no túbulo proximal, reabsorvidos no lúmen tubular, transportados de volta ao sangue e excretados na urina.
- E** O tempo de administração do medicamento interfere nos efeitos terapêuticos e adversos esperados para o paciente: a velocidade de infusão de 500 mL da solução de soro fisiológico 0,9% com 40 mL de KCl 19,1% e 10 mL de NaCl 20%, em 6 horas, é de 35 gotas/minuto.

▼ Questão 25

Mauro diluiu o medicamento anfotericina B em soro fisiológico. No entanto, a anfotericina B é incompatível com soro fisiológico e deveria ter sido diluída em soro glicosado 5%.

Nessa situação hipotética, a associação de medicamentos física ou quimicamente incompatíveis é um erro de

- A** apresentação.
- B** administração não autorizada de medicamento.
- C** preparo.
- D** dose.
- E** prescrição.

Questão 26

No que se refere à associação entre a espécie de bactéria gram-negativa patogênica e a doença causada por esse agente infeccioso, assinale a opção correta.

- Ⓐ *Yersinia pestis* – infecções urinárias
- Ⓑ *Bordetella pertussis* – sífilis
- Ⓒ *Neisseria meningitidis* – meningite bacteriana
- Ⓓ *Escherichia coli* – cólera
- Ⓔ *Treponema pallidum* – febre tifoide

Questão 27

Tendo em vista que os ambientes de saúde são compostos por diversos tipos de riscos, como biológicos, físicos, químicos e ergonômicos, assinale a opção que contempla corretamente ações de biossegurança em saúde.

- Ⓐ As mãos dos profissionais que atuam em serviços de saúde podem ser higienizadas, utilizando-se água e sabonete, preparação alcoólica e antisséptico degermante; no caso da preparação alcoólica, esta é indicada quando as mãos estiverem sujas ou contaminadas com fluidos corporais.
- Ⓑ As precauções padrão (PP) devem ser seguidas exclusivamente para os pacientes hospitalizados com infecções gram-negativas, sendo recomendados os seguintes EPIs: luvas, avental, óculos e máscara.
- Ⓒ Os resíduos que contenham produtos químicos que apresentam periculosidade à saúde pública ou ao meio ambiente (grupo A) devem ser acondicionados em saco branco leitoso.
- Ⓓ O treinamento para todos os profissionais envolvidos nas atividades em saúde deve contemplar prática de segregação dos RSS; símbolos, expressões e padrões de cores adotadas para o gerenciamento de RSS; e formas de reduzir a geração de RSS e a reutilização de materiais.
- Ⓔ Os produtos para saúde denominados semicríticos são aqueles que entram em contato com a pele íntegra ou com mucosas íntegras colonizadas.

Questão 28

Acerca da classificação e dos conceitos de classes de risco, assinale a opção correta.

- Ⓐ *Schistosoma mansoni* e o vírus da rubéola são exemplos de agentes biológicos de classe 3, ou seja, alto risco individual e moderado risco para a comunidade.
- Ⓑ Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é exemplo de agente biológico de classe 4, ou seja, alto risco individual e moderado risco para a comunidade.
- Ⓒ *Bacillus anthracis* é exemplo de agente biológico de classe 4, ou seja, alto risco individual e para a comunidade.
- Ⓓ Vírus ebola e vírus da varíola são exemplos de agentes biológicos de classe 2, ou seja, moderado risco individual e limitado risco para a comunidade.
- Ⓔ *Lactobacillus spp.* e *Bacillus subtilis* são exemplos de agentes biológicos de classe 1, ou seja, baixo risco individual e para a comunidade.

Questão 29

Considerando as principais medidas preventivas práticas para os casos de infecção da corrente sanguínea (ICS), assinale a opção correta.

- Ⓐ A utilização da técnica de pressão negativa e pulsátil para minimizar o retorno de sangue para o lúmen do cateter é recomendada para o *flushing* e a manutenção do cateter periférico.
- Ⓑ Com relação à higienização das mãos, estas devem ser higienizadas antes e após a inserção de cateteres e em qualquer tipo de manipulação dos dispositivos, ressaltando-se que o uso de luvas substitui a necessidade de higienização das mãos.
- Ⓒ Para atender à necessidade da terapia intravenosa, o uso de cateteres de maior calibre e menor comprimento de cânula é o recomendado; cateteres com maior calibre causam menos flebite mecânica e menor obstrução do fluxo sanguíneo dentro do vaso.
- Ⓓ Uma recomendação de alto nível de evidência quando do preparo da pele é realizar fricção desta com solução à base de álcool, a qual contenha gluconato de clorexidina em concentração acima de 0,5% e iodopovidona — PVP-I alcoólico 10% ou álcool 70%.
- Ⓔ Com o propósito de proteger o sítio de punção e minimizar a possibilidade de infecções, a cobertura para cateter periférico pode ou não ser estéril, desde que seja semioclusiva (gaze e fita adesiva) ou membrana transparente semipermeável.

Questão 30

As recomendações para a prevenção da infecção do trato urinário (ITU) incluem

- Ⓐ realizar a higiene rotineira do meato e sempre que necessário.
- Ⓑ manter o sistema de drenagem aberto e estéril.
- Ⓒ utilizar rotineiramente cateter impregnado com prata ou outro antimicrobiano.
- Ⓓ trocar o cateter urinário rotineiramente, preferencialmente a cada 21 dias.
- Ⓔ monitorar rotineiramente bacteriúria assintomática em pacientes com cateter.

Questão 31

Acerca do histórico e da organização do processo de trabalho em saúde e enfermagem, julgue os itens subsequentes.

- I O processo de enfermagem como instrumento metodológico surgiu no século XX.
- II Há participação bilateral na gestão do trabalho quando gestores e trabalhadores usam mesas de negociação permanente para definir, entre outras questões, rotinas dos processos de trabalho em saúde.
- III O diagnóstico de enfermagem é realizado antes da anamnese ou, eventualmente, simultaneamente.

Assinale a opção correta.

- Ⓐ Apenas o item II está certo.
- Ⓑ Apenas o item III está certo.
- Ⓒ Apenas os itens I e II estão certos.
- Ⓓ Apenas os itens I e III estão certos.
- Ⓔ Todos os itens estão certos.

Questão 32

Assinale a opção correta, relativa a procedimentos técnicos de enfermagem.

- A Na punção capilar ou percutânea, deve-se apertar o local para a obtenção do sangue em esfregaço.
- B O tamponamento deve ser feito no pós-morte imediato à constatação do médico, independentemente da assinatura do atestado de óbito ou de encaminhamento ao Instituto Médico Legal.
- C No caso de ministração de medicamento pela via nasal, a posição de cabeça alinhada com pescoço (Proetz) é mais adequada para atingir os seios frontais e maxilares, ao passo que a posição de cabeça de lado (Parkinson) é a mais adequada para se alcançar os seios esfenoidais e etmoidais.
- D O profissional de enfermagem é o responsável pela colocação de supositório no paciente, já que há o risco de ele não executar o procedimento corretamente.
- E Para a coleta de urina tipo I, deve-se colher o jato médio diretamente no coletor, preferencialmente o primeiro da manhã, e, caso a pessoa esteja em período menstrual, usar tampão para evitar contaminação da amostra por sangue.

Questão 33

Acerca de políticas de assistência em saúde coletiva e de atenção básica, assinale a opção correta.

- A Recomenda-se que as unidades básicas de saúde monitorem a satisfação de seus usuários.
- B O gerente de atenção básica deve ser escolhido entre os integrantes das equipes vinculadas à unidade básica de saúde bem como deve continuar atuando em ambas as frentes.
- C A promoção de mobilidade segura e sustentável e de cultura de paz e de direitos humanos são dois temas de relevância geral que devem ser priorizados nas ações de promoção da saúde.
- D As unidades básicas de saúde devem ter como referência, principalmente, as determinações e as recomendações da secretaria municipal de saúde bem nas ações programáticas após a definição dos serviços que serão oferecidos em seu território.
- E Após treinamento específico, o agente comunitário de saúde pode aferir a pressão arterial dos pacientes em sua área de atuação regularmente, para que os demais profissionais da equipe dediquem-se a outras ações e atividades.

Questão 34

De acordo com as referências do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a opção correta, relativa à assistência em saúde mental.

- A Ainda que, na atenção básica, seja comum que problemas de saúde mental derivem de conflitos entre dois usuários do mesmo serviço ou unidade, o profissional deve abster-se de interferir ou tentar mediar o conflito, voltando sua intervenção para a redução de danos, de forma individual.
- B Recursos tecnológicos, como o eletroencefalograma ou a tomografia computadorizada mostram-se pouco efetivos para se elucidar problemas de saúde mental.
- C Terapias comunitárias efetivas requerem a presença de toda a equipe de saúde mental e uma seleção prévia dos participantes, excetuando-se os pacientes que se prejudicarão com tal terapia.
- D Atitudes do usuário de serviços de saúde mental estão intrinsecamente relacionadas a sua identidade, estando o profissional da área impossibilitado de distinguir certas atitudes, ainda que se busque contextualizar as ações do paciente.
- E Terapia interpessoal breve, ou intervenção breve, tem sido utilizada no SUS em crianças e tem apresentado bons resultados, diferentemente do que ocorre com adultos que apresentam problemas com álcool ou outras drogas.

Questão 35

Quanto às esterilizações de materiais utilizados em casos de pacientes cirúrgicos e acerca dos procedimentos seguros ou autorizados sobre essa prática, julgue os itens a seguir.

- I Se os pacotes de materiais esterilizados na autoclave ficarem úmidos, a sua secagem pode ser feita em estufa.
- II Os pacotes de materiais devem ocupar a totalidade da capacidade de armazenamento da autoclave, a fim de otimizar o processo.
- III Casos de urgência ou de emergência constituem as únicas exceções ao emprego do ciclo de esterilização a vapor para o uso imediato.

Assinale a opção correta.

- A Nenhum item está certo.
- B Apenas o item I está certo.
- C Apenas o item II está certo.
- D Apenas o item III está certo.
- E Todos os itens estão certos.

Questão 36

Conforme as orientações do Ministério da Saúde sobre questões relacionadas ao trato urinário, assinale a opção correta.

- A A inserção de cateter urinário é essencialmente asséptica e, por isso, raramente é causa de infecção do trato urinário.
- B No que se refere à possibilidade de infecção, é indiferente conectar de modo aberto ou fechado o sistema de drenagem à sonda de demora.
- C Saída de urina é parâmetro inadequado para avaliar a eficácia do cateter vesical de demora quando o paciente apresenta baixo débito urinário.
- D Para coletar, de forma segura, a urina de paciente com sonda vesical para a realização de exame, deve-se desconectar a junção entre a sonda e o sistema coletor e, depois da coleta, desinfetar o sistema.
- E O cateterismo vesical de alívio provoca agressão à parede uretral e resulta em maior risco de infecção se comparado ao cateterismo de demora.

Questão 37

Com relação aos saberes ligados à assistência ao paciente com angina, julgue os itens a seguir.

- I Recomendar que o usuário faça uso sublingual de nitroglicerina de forma preventiva a crises de angina típicas de atividades intensas, como relações sexuais, é contraindicado.
- II Evitar descongestionantes nasais está entre as recomendações típicas da equipe de enfermagem aos pacientes que sofrem com angina, em função de essa classe de medicamentos, frequentemente, elevar a frequência cardíaca.
- III Administrar nitroglicerina imediatamente após o surgimento da dor da angina pode evitar a ocorrência de infarto agudo do miocárdio.

Assinale a opção correta.

- A Nenhum item está certo.
- B Apenas o item I está certo.
- C Apenas o item II está certo.
- D Apenas o item III está certo.
- E Todos os itens estão certos.

Questão 38

Assinale a opção correta, relativa a conhecimentos ligados à assistência ao paciente com disfunções renais.

- Ⓐ A glomerulonefrite aguda e a glomerulonefrite crônica têm causas diferentes, o que faz que a repetição frequente de episódios da primeira esteja dissociada do surgimento da segunda.
- Ⓑ A manifestação clínica indolor de urolitíase é rara.
- Ⓒ O padrão-ouro para o diagnóstico de cálculos é o exame de urina tipo I.
- Ⓓ A insuficiência renal crônica conduz a quadros de anemia em algum grau, tendo como um fator de relação a produção diminuída de eritropoetina.
- Ⓔ A glomerulonefrite aguda pós-infecção de vias aéreas pode ocorrer em qualquer grupo de bactérias capaz de infectar o sistema respiratório.

Questão 39

Com referência à assistência a pacientes com disfunções endócrinas, assinale a opção correta.

- Ⓐ Os cuidados recomendados para lesões ulceradas nos pés de pessoas com *Diabetes Mellitus* incluem o emprego de solução furacinada, permanganato de potássio ou pomadas com antibióticos nos curativos.
- Ⓑ Os três tipos de *diabetes mellitus* são a do tipo 1, a do tipo 2 e a gestacional.
- Ⓒ O uso de contraceptivos hormonais orais é considerado aspecto relevante para a história clínica da pessoa com *Diabetes Mellitus*, uma vez que esses fármacos podem alterar a glicemia.
- Ⓓ A hiperprolactinemia deve-se a uma produção excessiva de prolactina na tireoide, o que gera desequilíbrios de iodo no organismo.
- Ⓔ *Acanthosis nigricans* é um dos principais critérios de rastreamento de disfunções na secreção de melatonina pela glândula pineal.

Questão 40

No que se refere à assistência ao paciente com disfunções digestivas e gastrointestinais, assinale a opção correta.

- Ⓐ As causas da cirrose hepática são apenas o contato frequente com substâncias hepatotóxicas e o consumo crônico de bebidas alcoólicas.
- Ⓑ A pancreatite crônica é resultado do desenvolvimento da forma aguda da doença, em que sucessivas repetições de episódios geram perda progressiva do tecido pancreático, causam fibrose e provocam lesões anatômicas irreversíveis.
- Ⓒ O aporte calórico do paciente, em alguns casos de pancreatite aguda, passa a ser de nutrição parenteral total, a fim de inibir a estimulação e a secreção das enzimas pancreáticas.
- Ⓓ A diferenciação da úlcera duodenal e da úlcera gástrica é difícil em razão de terem fatores comuns, a exemplo do estado nutricional do paciente; a presença, a frequência e o tipo de vômitos e de hemorragias; e a relação entre dor e ingestão de alimentos.
- Ⓔ As hepatites dos tipos A, B e C são virais, ao passo que a hepatite do tipo D deve-se à presença de substâncias hepatotóxicas no organismo.

Questão 41

De acordo com a Rede de Atenção Materno-Infantil, julgue os itens a seguir, relativos aos fatores de risco e à estratificação de risco gestacional.

- I Os fatores e determinantes sociais devem ser mapeados e abordados continuamente, pois, na gestação, se tornam mais relevantes que os determinantes biológicos já presentes na vida da mulher em idade fértil.
- II Os recursos e as rotinas dedicados ao alto risco, se usados para as gestantes de baixo risco, melhora a qualidade assistencial e seus resultados.
- III Quanto maior for o número de critérios combinados — seja vários fatores de risco intermediário combinados, um fator de alto risco combinado com fatores de risco intermediário ou vários fatores de alto risco — maior deverá ser a vigilância e o cuidado durante a gestação.

Assinale a opção correta.

- Ⓐ Nenhum item está certo.
- Ⓑ Apenas o item I está certo.
- Ⓒ Apenas o item II está certo.
- Ⓓ Apenas o item III está certo.
- Ⓔ Todos os itens estão certos.

Questão 42

À luz da Portaria GM/MS n.º 715/2022, que instituiu a Rede de Atenção à Saúde Materno-Infantil (REMI), julgue os seguintes itens.

- I Um dos objetivos da REMI é a redução da morbimortalidade materna e infantil.
- II O rastreamento, o diagnóstico, o tratamento e o acompanhamento das IST/HIV/AIDS, HTL-V, hepatites e toxoplasmose passaram a ser ações do componente II (atenção ambulatorial especializada).
- III A disponibilização de leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) para adultos e crianças, de acordo com a necessidade regional e com garantia de cuidado progressivo ao recém-nascido, é ação estratégica do componente III (atenção hospitalar).

Assinale a opção correta.

- Ⓐ Apenas o item II está certo.
- Ⓑ Apenas o item III está certo.
- Ⓒ Apenas os itens I e II estão certos.
- Ⓓ Apenas os itens I e III estão certos.
- Ⓔ Todos os itens estão certos.

Questão 43

No que concerne à assistência de enfermagem ao adolescente hospitalizado, assinale a opção correta.

- Ⓐ Os adolescentes maiores de 16 e menores de 18 anos de idade não necessitam de acompanhamento familiar durante a hospitalização.
- Ⓑ A assistência prestada no ambiente hospitalar deve focar os períodos pré-operatório, intraoperatório e pós-operatório.
- Ⓒ Os contatos dos adolescentes com serviços de saúde constituem oportunidades para a investigação de outras condições de saúde, doenças e(ou) vulnerabilidades de comportamento de risco.
- Ⓓ Caso um adolescente seja hospitalizado para realização de procedimento cirúrgico devido a trauma em MID, ocasionado por acidente de trânsito, não compete à enfermagem a investigação a respeito da relação do acidente com o consumo de álcool ou drogas.
- Ⓔ As ações de educação e promoção de saúde para adolescentes em condição de vulnerabilidade devem ser realizadas nas unidades básicas de saúde.

Questão 44

No que se refere à exposição e ao controle do ambiente durante a avaliação inicial do trauma, a intervenção de enfermagem correta consiste em

- A** observar a cor da pele e as mucosas.
- B** monitorar os sinais vitais, quando apropriado.
- C** monitorar a resposta do paciente à reposição de líquidos.
- D** prevenir quedas do paciente, com contenção, se necessário.
- E** monitorar a oximetria.

Questão 45

Assinale a opção em que a correspondência entre o sinal e(ou) sintoma de acidente vascular cerebral (AVC) agudo e a conduta de enfermagem está correta.

- A** perda súbita de força – solicitar TC de crânio com contraste
- B** perda súbita de sensibilidade – solicitar TC de crânio com contraste
- C** dificuldade visual e de fala – monitorizar a pressão arterial
- D** cefaleia intensa súbita – aplicar a escala NIHSS
- E** dor torácica – colocar a cabeceira reta

Questão 46

Na monitorização não invasiva em unidade de terapia intensiva (UTI),

- A** deve-se aferir a pressão arterial a cada 6 h e comunicar à equipe possível risco de pressão arterial instável.
- B** o monitoramento dos sinais e sintomas do estado de perfusão tissular consiste em avaliar ritmo e esforço respiratório.
- C** o parâmetro ideal da frequência respiratória é 12 rpm a 40 rpm.
- D** o parâmetro adequado da capnografia (ETCO₂) é de 35 mmHg a 45 mmHg.
- E** o eletrocardiograma objetiva avaliar o ritmo e a frequência dos batimentos cardíacos.

Questão 47

Uma criança de 7 anos de idade foi atropelada por um veículo em alta velocidade. Após atendimento primário e condutas pré-hospitalares, verificou-se trauma pélvico com compressão anteroposterior, sendo realizada fixação externa por médico ortopedista após a obtenção da estabilização hemodinâmica. Por fim, o paciente foi encaminhado para a unidade de terapia intensiva (UTI).

Na situação hipotética apresentada, a conduta adequada do técnico de enfermagem durante o atendimento intra-hospitalar consistirá em

- A** monitorizar o paciente.
- B** orientar os familiares ou responsáveis legais quanto aos riscos e benefícios dos procedimentos.
- C** elaborar o plano de cuidados do paciente de acordo com a sistematização da assistência de enfermagem (SAE).
- D** acompanhar pacientes instáveis a outros setores.
- E** preparar o paciente, o material e o local para acesso parenteral e realizar curativos ou fixação.

Questão 48

Acerca da assistência de enfermagem à mulher durante o climatério, assinale a opção correta.

- A** A equipe de enfermagem deve orientar sobre a importância da realização do exame clínico das mamas apenas durante o climatério.
- B** A terapia estrogênica deve ser considerada como a primeira opção para a prevenção e o tratamento da osteoporose.
- C** Há resistência, por parte de mulheres que estão no climatério, a adotar novos hábitos e fazer mudanças no estilo de vida, quando orientadas pela equipe de enfermagem.
- D** O fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico por meio da prática dos exercícios de Kegel pode ser iniciado a qualquer momento, em qualquer lugar e em qualquer idade, independentemente da posição adotada.
- E** Durante o climatério, devido às muitas condições clínicas da mulher, é recomendado que o profissional indique o método contraceptivo mais adequado.

Questão 49

As informações sobre sinais de complicações puerperais e outras que se refiram ao autocuidado e ao cuidado com o recém-nascido devem

- A** ser fornecidas durante o pré-natal.
- B** abordar a necessidade de buscar rapidamente os serviços de saúde.
- C** orientar que a dor na ferida operatória, em caso de cesariana, e a presença de secreção são situações fisiologicamente normais.
- D** orientar a interrupção do aleitamento materno em caso de contrações uterinas durante a amamentação, a fim de evitar o aumento dos sangramentos.
- E** orientar que o quadro de tristeza no puerpério está sempre relacionado à queda brusca dos hormônios.

Questão 50

Acerca da hospitalização infantil, julgue os seguintes itens.

- I As crianças em idade escolar são capazes de entender sua doença e seu tratamento.
- II Por meio do uso de brinquedos, é possível oferecer cuidados de enfermagem que levem em conta o modo como a criança hospitalizada gostaria de ser cuidada.
- III Nos ambientes hospitalares, a abordagem caracterizada por brincadeiras entre as crianças e os profissionais de enfermagem é limitada devido ao pouco tempo disponível e à rigidez dos protocolos e rotinas.

Assinale a opção correta.

- A** Apenas o item I está correto.
- B** Apenas o item II está correto.
- C** Apenas os itens I e III estão corretos.
- D** Apenas os itens II e III estão corretos.
- E** Todos os itens estão corretos.

Questão 51

Conforme a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, as estratégias de saúde do trabalhador referentes à atenção especializada ambulatorial e hospitalar visam

- Ⓐ à identificação da relação entre o trabalho e o acidente, violência ou intoxicação exógena sofridos pelo usuário, com decorrente notificação do agravo no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
- Ⓑ ao encaminhamento dos trabalhadores para a rede de referência e contrarreferência, para fins de continuidade do tratamento, acompanhamento e reabilitação, consoante os fluxos e instrumentos definidos para tal.
- Ⓒ ao acolhimento e à resposta às demandas dos representantes da comunidade e do controle social.
- Ⓓ ao estímulo à participação de representantes dos trabalhadores nas instâncias oficiais de representação social do SUS, por meio de conselhos e comissões intersetoriais, nas três esferas de gestão do SUS.
- Ⓔ à produção de tecnologias mistas de educação presencial e à distância e à publicização de tecnologias existentes.

Questão 52

Segundo a Resolução COFEN n.º 564/2017, que institui o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem,

- Ⓐ o profissional de enfermagem tem o direito de aceitar cargo, função ou emprego vago em decorrência de fatos que envolvam recusa ou demissão motivada pela necessidade do profissional em cumprir o presente código e a legislação do exercício profissional.
- Ⓑ é direito do profissional de enfermagem suspender as atividades, individuais ou coletivas, quando o local de trabalho não oferecer condições seguras para o exercício profissional e/ou desrespeitar a legislação vigente, ressalvadas as situações de urgência e emergência.
- Ⓒ é dever do profissional de enfermagem executar procedimentos ou participar da assistência à saúde, mesmo sem o consentimento formal da pessoa ou de seu representante ou responsável legal, exceto em iminente risco de morte.
- Ⓓ é proibido ao profissional de enfermagem, quando intimado como testemunha, declarar suas razões éticas para manutenção do sigilo profissional.
- Ⓔ é direito do profissional de enfermagem negar assistência de enfermagem em situações de urgência, emergência, epidemia, desastre e catástrofe, desde que isso não ofereça risco à integridade física do profissional.

Questão 53

A todo usuário do SUS, na relação com os serviços de saúde, é garantido(a)

- Ⓐ o sigilo e a confidencialidade de todas as informações pessoais, até a constatação do óbito do usuário, momento após o qual tais informações deixam de ser sigilosas.
- Ⓑ a participação nos processos de indicação e/ou eleição de seus representantes nas conferências de saúde, nos conselhos de saúde e nos conselhos gestores da rede SUS.
- Ⓒ o acesso ao conteúdo de seu prontuário e o fornecimento de cópia, sendo este último somente possível em casos de doenças que envolvam risco à saúde pública.
- Ⓓ o consentimento livre, voluntário e esclarecido a quaisquer procedimentos diagnósticos, preventivos ou terapêuticos, mesmo em casos que possam acarretar risco à saúde pública.
- Ⓔ a indicação da pessoa a quem será confiada a tomada de decisão em eventual incapacidade do usuário em exercer sua autonomia, desde que este tenha 60 anos de idade ou mais.

Questão 54

De acordo com a NR 32, do Ministério do Trabalho e Emprego, os agentes biológicos são classificados em classes de risco. A classe de risco I apresenta

- Ⓐ risco individual baixo para o trabalhador e para a coletividade, com baixa probabilidade de causar doença ao ser humano.
- Ⓑ risco individual moderado para o trabalhador, com baixa probabilidade de disseminação para a coletividade.
- Ⓒ risco individual elevado para o trabalhador, com probabilidade elevada de disseminação para a coletividade.
- Ⓓ risco elevado de causar doenças ao ser humano, para as quais existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento.
- Ⓔ risco individual elevado para o trabalhador, com probabilidade de disseminação para a coletividade.

Questão 55

Podem ser prevenidas por meio de vacinação

- I a hepatite A.
- II a hepatite B.
- III a hepatite C.

Assinale a opção correta.

- Ⓐ Apenas o item II está certo.
- Ⓑ Apenas o item III está certo.
- Ⓒ Apenas os itens I e III estão certos.
- Ⓓ Apenas os itens I e II estão certos.
- Ⓔ Todos os itens estão certos.

Questão 56

Acerca dos equipamentos de proteção individual e coletiva, julgue os itens a seguir.

- I Óculos e protetor facial são equipamentos de proteção individual.
- II As placas sinalizadoras são equipamentos de proteção coletiva.
- III A caixa de perfurocortante compõe os equipamentos de proteção individual.

Assinale a opção correta.

- Ⓐ Apenas o item II está certo.
- Ⓑ Apenas o item III está certo.
- Ⓒ Apenas os itens I e II estão certos.
- Ⓓ Apenas os itens I e III estão certos.
- Ⓔ Todos os itens estão certos.

Questão 57

No que se refere ao modo de transmissão de doenças de interesse para a saúde pública, é correto afirmar que

- Ⓐ a transmissão do sarampo ocorre pelo sangue ou por secreções nasofaríngeas expelidas por uma pessoa ao tossir ou espirrar.
- Ⓑ o HIV pode ser transmitido por via sexual, pelo sangue e pelo leite materno.
- Ⓒ as hepatites virais A, B, C, D e E são transmitidas pela via fecal-oral.
- Ⓓ a transmissão da hanseníase ocorre pelo contato com sangue ou aerossóis oriundos das vias aéreas de uma pessoa com hanseníase, sem tratamento.
- Ⓔ a tuberculose é transmitida por meio de gotículas de secreção respiratória e por fômites contaminados.

Questão 58

A respeito da dengue, assinale a opção correta.

- Ⓐ Febre menor ou igual a 38 °C constitui o principal sintoma da dengue.
- Ⓑ O período de viremia da dengue se estende até o 10.º dia do início dos sintomas.
- Ⓒ Sangramento de mucosas é um sinal de alarme que indica piora clínica do paciente com dengue.
- Ⓓ A dengue pode apresentar três fases clínicas: aguda, pós-aguda e crônica.
- Ⓔ O período de incubação da dengue é de 2 a 7 dias.

Questão 59

Acerca do tétano acidental, assinale a opção correta.

- Ⓐ A prevenção da doença acontece principalmente por meio da melhoria da infraestrutura dos serviços de abastecimento de água para consumo humano, de coleta de lixo e de tratamento de esgotos e resíduos sólidos.
- Ⓑ A infecção ocorre pela introdução de esporos através de ferimentos superficiais ou profundos na pele e nas mucosas.
- Ⓒ As manifestações clínicas incluem hipotonias musculares e contraturas paroxísticas que se manifestam à estimulação tátil e sonora do paciente.
- Ⓓ A transmissão da doença ocorre de forma direta, de um indivíduo para outro.
- Ⓔ O diagnóstico do tétano é confirmado por meio de exame laboratorial específico, mediante coleta de amostra de sangue.

Questão 60

Entre as infecções sexualmente transmissíveis, aquela que pode ser prevenida por vacinação é

- Ⓐ a sífilis.
- Ⓑ a gonorreia.
- Ⓒ o papilomavírus humano.
- Ⓓ o herpes genital.
- Ⓔ a clamídia.

Espaço livre