

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --**Questão 26**

Levando em consideração as contribuições da psicopatologia, o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais (DSM-5) e a Classificação Internacional das Doenças (CID-10), assinale a opção correta.

- A Transtornos de sintomas somáticos não estão associados a transtornos depressivos.
- B Ideias recorrentes de doença e comportamentos repetitivos associados são características de quadros de sintomas somáticos.
- C Medo de contrair doença é um dos critérios para diagnóstico de transtorno depressivo.
- D Humor disfórico e anedonia são sintomas de quadros depressivos.

Questão 27

Antunes, de 15 anos de idade, saiu de casa aos 10 anos de idade, depois de uma briga física com o pai. Desde então, Antunes mora na rua. O relato a seguir foi feito por ele.

“Eu sei que não sou santo, mas, também, nem poderia. Cresci vendo meu pai chegar bêbado em casa, bater na minha mãe e nos meus irmãos. Nunca suportei o que ele fazia com a gente. Eu era bem pequeno quando comecei a me dar conta de tudo. Quando eu tinha 10 anos, ele chegou muito diferente em casa, parecia que não tinha sido só a bebida dessa vez. O cheiro era muito forte. Muito tempo depois, quando já morava na rua, me dei conta do que era. A primeira vez que eu senti o cheiro, lembrei logo do dia que apanhei do meu pai e fugi de casa. Hoje cheiro cola todo dia e, a cada vez, preciso de mais. Não consigo viver sem. Já tentei parar, mas não consigo. Deixei de estudar e fazer minhas coisas por conta disso. Sei que isso vai acabar mal, mas, hoje, é o que mata minha fome, minha sede e a saudade que sinto da minha mãe e dos meus irmãos” (*sic*).

Considerando esse caso clínico hipotético, o DSM-5, a CID-10 e as contribuições da psicopatologia, assinale a opção correta.

- A Caso Antunes prolongue o uso de inalantes até a vida adulta, isso poderá causar-lhe grandes prejuízos, até mesmo transtorno da personalidade antissocial.
- B Antunes apresenta transtorno por uso de inalantes moderado.
- C Numa possível avaliação psicológica do quadro de Antunes, devem ser desconsiderados fatores temperamentais e fisiológicos.
- D Fatores genéticos podem ser excluídos na avaliação psicológica de Antunes, haja vista a sintomatologia clínica dele.

Questão 28

Com relação à psicologia do desenvolvimento, às contribuições da psicopatologia e aos efeitos da violência, julgue os itens a seguir.

- I A violência é uma questão de saúde pública que pode gerar impasses no desenvolvimento emocional, dificuldades psicológicas e cognitivas na vítima.
- II Aborto espontâneo e AIDS constituem comprometimentos físicos que não estão relacionados a contextos de violência.
- III O contexto de violência pode desencadear graves impactos no contexto da saúde mental da vítima, inclusive posteriores tentativas de suicídio.
- IV Alterações de memória e alucinações constituem sintomas clínicos presentes em diversos quadros psicopatológicos, mas não podem ser associadas a contextos de violência.

Estão certos apenas os itens

- A I e II.
- B I e III.
- C II e IV.
- D III e IV.

Questão 29

No que se refere às abordagens teóricas e técnicas em psicologia, assinale a opção correta.

- A De acordo com as contribuições de Melanie Klein, o bebê apresenta-se como um ser ativo na construção subjetiva da realidade, sendo o desenvolvimento do eu marcado pela projeção, ambivalência, onipotência e negação já na posição depressiva.
- B De acordo com Melanie Klein, o analista deve atuar no campo das fantasias inconscientes da criança, enfatizando o papel dos pais como importantes mensageiros da fala infantil.
- C A abordagem kleiniana entende a travessia da posição esquizoparanoide e a possibilidade de reparação da relação objetal, com a assimilação de objetos bons, como essenciais para o aparecimento do complexo de Édipo.
- D De acordo com Jacques Lacan, o bebê se desenvolve psiquicamente a partir de sua dependência absoluta do meio; assim, se os pais falham nos cuidados, a criança poderá desenvolver uma perversão ou mesmo tendências à depressão e a manias.

Questão 30

No que se refere às políticas e ações de enfrentamento à violência, é correto afirmar que constituem a rede intrassetorial

- A secretarias especiais e sistema de justiça e de direitos humanos.
- B Conselho Nacional de Saúde e secretarias municipais de saúde.
- C saúde da pessoa com deficiência e atenção especializada.
- D Sistema Único da Assistência Social (SUAS) e Estratégia Saúde da Família.

Questão 31

No que se refere aos transtornos psicóticos e ao espectro da esquizofrenia, assinale a opção correta.

- A Para efeitos diagnósticos de transtorno psicótico devido a outra condição médica, o quadro clínico ocorre exclusivamente durante o curso do *delirium*.
- B O transtorno delirante é caracterizado por discurso desorganizado, alucinações e delírios proeminentes.
- C O transtorno esquizofreniforme apresenta descarrilamento, delírios niilistas e bizarros, com importante declínio funcional, podendo durar de 1 a 12 meses.
- D Para fins diagnósticos de transtorno esquizoafetivo, a perturbação clínica não pode ser atribuída aos efeitos de droga de abuso.

Questão 32

De acordo com o Código de Ética Profissional do Psicólogo, infrações disciplinares podem ser penalizadas com

- A multa.
- B suspensão do exercício profissional por tempo indeterminado, *ad referendum* do Conselho Federal de Psicologia.
- C suspensão do exercício profissional por, no mínimo 30 dias, *ad referendum* do Conselho Federal de Psicologia.
- D censura privada e pública.

Questão 33

O modelo conceitual de dor que não se compromete com aspectos fisiológicos e postula a existência de elementos funcionais que atuam, dentro do organismo, como mediadores entre o ambiente e o comportamento, constitui a teoria

- A fisiológica e comportamental.
- B cognitiva.
- C psicanalítica.
- D do comportamento.

Questão 34

A avaliação da dor pode ser feita por meio de

- A exames laboratoriais e técnicas projetivas.
- B testes objetivos e relatos subjetivos.
- C técnicas projetivas e relatos subjetivos.
- D exames laborais e testes objetivos.

Questão 35

Uma estratégia de padrão direto utilizada pelos indivíduos engloba o mecanismo de

- A repressão.
- B negação.
- C isolamento.
- D enfrentamento.

Questão 36

Considerando os conhecimentos da história natural para tornar improvável o progresso posterior da doença, a fase de ações que visa à reintegração do indivíduo à sociedade diz respeito a ações de

- A prevenção secundária.
- B pré-patogênese.
- C promoção à saúde.
- D reabilitação.

Questão 37

O apoio psicológico no tratamento multidisciplinar da doença obesidade deve

- A conter uma dieta para o paciente com o objetivo de modificar os hábitos alimentares envolvidos na etiologia e manutenção da obesidade.
- B dispor de avaliações sobre as causas biológicas da obesidade e suas possíveis complicações, para direcionar o tratamento da maneira mais adequada, prescrevendo e monitorando eventuais medicações.
- C estar diretamente focado no cuidado da saúde mental do indivíduo por meio de tratamento medicamentoso ou psicoterápico.
- D identificar e tratar comorbidades psiquiátricas e transtornos alimentares relacionados à obesidade.

Questão 38

O principal objetivo do psicólogo no campo institucional é

- A levantar hipóteses sobre os possíveis problemas da instituição.
- B promover atividades psicoterápicas.
- C promover psico-higiene.
- D proceder à observação.

Questão 39

Assinale a opção correspondente à reabilitação psicológica de maior abrangência, voltada para déficits cognitivos, com o objetivo de auxiliar no tratamento de alterações de causa comportamental e emocional, e na melhora do paciente e sua qualidade de vida.

- A reabilitação cognitiva
- B reabilitação psicomotora
- C reabilitação neuropsicológica
- D reabilitação física

Questão 40

A tabela a seguir mostra o resultado de um estudo clínico hipotético com a participação de 1.500 pacientes, dos quais 560 eram pessoas expostas à determinada doença, mas que não a desenvolveram.

		desenvolveram a doença		
		sim	não	total
expostas	sim	240	560	800
	não	140	560	700
total		380	1.120	1.500

Considerando-se os dados da tabela, infere-se que a estatística denominada *risco relativo* (*relative risk*) é igual a

- A 1.
- B 12/7.
- C 24/19.
- D 3/2.